

明鈔本金匱要略方二卷

仲昭先生世守秘笈

徐乃昌題



張仲景爲傷寒卒病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙存日於蠹簡中得仲景金匱玉函要略方三卷上則辨傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以方證對病者施之於人其効若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備

國家詔儒臣校正醫書臣奇先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又采散在諸家之方附於逐篇之末以廣其法以其傷寒文多節略故取自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重複各二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱要略

方臣奇嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚奇怪不合聖人之經臣奇謂活人者必仲景書也大抵炎農聖法屬我盛旦恭惟

主上丕承大統 撫育元元 頒行方書 涼濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡和矣太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫奇尚書司封郎中充祕閣校理臣林億等謹上金匱要略方敘

仲景金匱錄岐黃韓素之方近將千卷患其混雜煩重有求難得故周流華裔九州之內收合奇異拾遺逸撰而集之揀選諸經筋髓以為要略一編其諸救療暴病使知其次第凡此藥石者是諸神仙之所造服之將之固無夭橫或治療不早或被師誤幸具詳焉

金匱要略方卷上

書館藏

正

直指

三書

漢張仲景述 晉王叔和集

臣林億等註次

火氣盛則傷肺文字上落
則肝自愈時字上落
則脾自愈盛字上落
則胃自愈脾字下落
此法經補之要妙脾字

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾正不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入脾甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛則肝自愈此治肝補之要妙也肝虛則用心法實則不在用之經云虛虛實實補不足損有餘是其義也餘藏準此夫人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五藏元真通暢人即安和客氣邪風中人多死千般疾難不越三條一者經絡受邪入藏府

吳略二

一

爲內所因也二者四肢九竅血脉相傳壅塞不通爲外皮膚所中也三者房室金刃蟲獸所傷以此詳之病由都盡若人能養慎莫令邪風干忤經絡適中經絡未流傳府藏即醫治之四肢亦覺重滯即導引吐納針灸膏摩勿令九竅閉塞更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭之取食節其冷熱苦酸辛甘不遺形體有憂病則無由入其腠理腠者是三焦通會元真之處爲血氣所注理者是皮膚藏府之文理也

藏府經絡先後病脉證第一

症濕渴病脉證第二

百合狐惑陰陽毒病脉證并治第三

瘧病脉證并治第四

中風歷節病脉證并治第五

房室勿令竭也之字誤當
四肢筋骨重深亦字誤當

血痺虛勞病脉證并治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證并治第七

奔豚氣病脉證并治第八

腎痺心痛短氣病脉證并治第九

腹滿寒疝宿食病脉證并治第十

藏府經絡先後病脉證第一

問曰病人有氣色見於面部顧聞其說師曰鼻頭青色腹中痛苦冷者死云腹中冷告痛者死鼻頭色微黑者有水氣色黃者肓上有寒色白者亡血色設微亦非時者死其目正圓者痓不治又色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者便難色鮮明者有畱飲

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑然不徹

晏略二

二

諸病氣色細而長者頭中病一作痛

師曰息搖肩者心中堅息引肓中上氣者歎息張口短氣者肺痿唾沫

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸速此皆難治呼吸動搖振者不治

師曰寸口脈動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脉皆當病

師曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也師曰冬至之後甲子夜半以陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至也以得甲子而天大寒不解此為至而不

去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此爲至而太過也

師曰病人脉浮者在前其病在表浮者在後其病在裏腰痛背強不能行必短氣而極恐

問曰經云厥陽獨行何謂也師曰此爲有陽無陰故稱厥陽

問曰寸脉沈大而滑沈則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入藏即死入府即愈此爲卒厥何謂也師曰唇口青身冷爲入藏即死如身和汗自出爲入府即愈

問曰脉脫入藏即死入府自愈何謂也師曰非病百病皆然辭如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治諸病在外者可治入裏者即死

問曰陽病十八何謂也師曰頭痛項脰脊脚掣痛問曰陰病十八何謂也師曰歟上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急五藏病

各有十八合爲九十病人又有六微微有十八病合爲一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中衣小邪中裏繫飮之邪從口入者宿食也五邪中人各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脉浮寒令脉急霧傷皮腠濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡問曰病有急當救裏救表者何謂也師曰病醫下之續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也

夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

師曰五藏病各有得者愈五藏病各有所惡各隨其所不喜者爲病病者素不應食而反暴思之必發熱也

夫諸病在藏欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯他

皆倣此

瘡濕喝病脉證并治第二

論一十六條

一首方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘡

餘同

作瘡

太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡

太陽病發熱汗太多因致瘡

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭動搖卒口噤背反張者症病也

症病發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇

一云其暴脹脈大者為欲解脉如故反伏弦者症

太風病下之則症復發汗必拘急

大瘡脉按之緊如弦直上下行

其脉上

四

瘡病有矣瘡難治

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則症

太陽病其證備身體強急然脉反沈遲此為瘡桔梗桂枝湯主之方

桔梗根二兩桂枝三兩

去皮

芍藥三兩

甘草二兩

生薑三兩

切

大棗十二枚

一枚

右六味㕮咀以水九升煮取三升去滓分溫三服取微汗汗不出食煩囁熱渴發之

太陽病無汗而小便反少氣上衝口噤不得語欲作剛瘡葛根湯主之方

葛根四兩

麻黃三兩

去節

桂枝二兩

去皮

生薑三兩

切

甘草二兩

芍藥三兩

一枚

大棗十二枚

一枚

甘草二兩

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根一二沸去上沫內諸藥者取三升去滓溫服一升取微似汗

剛症為病脣滿口噤臥不着席脚攣急其人必齦齒可與大承氣湯方

大黃

四兩去皮酒洗

厚朴半斤

枳實

五枚

芒消

卷合

右四味㕮咀以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服一服得下餘勿服

太陽病關節疼痛而煩脉沈而細緩

一作者此名濕痺

玉函云濕

痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便

濕家之為病一身盡疼發熱身色如熏黃也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔

中漏

膏肓也

小便不利舌上如胎者以丹田有熱脣上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也
濕家下之額上汗出微喘小便利一云者死若下利不止者亦死

風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解慎天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈濕家身煩瘞可與麻黃湯加木四兩發其汗為宜慎不可以火攻之方

麻黃去節 壓兩

桂枝去皮 文兩

甘草炙 二兩

杏人去皮尖 柔拾個

白木四 兩

右五味咬咀以水九升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥
煮取二升去滓溫服八合取微似汗

病者一身盡疼穀熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當
風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡仁甘草湯方

麻黃去節 六兩

杏人去皮尖 柔拾個

甘草炙 二兩

甘草炙 二兩

右四味咬咀以水四升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥
煮取二升去滓分溫再服

風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之方

防已四 兩

黃耆五 兩

甘草炙 二兩

白木參 兩

生薑切 二兩

大棗拾 摩

臭吐一

六

右六味咬咀以水七升煮取二升去滓分溫三服喘者加
麻黃胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂下有陳寒者加
細辛服後當如蟲行皮中從腰以上如冰後坐被上火以
一被繞腰以溫下令微汗差腰以上
作腰以下

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮
虛而濶者桂枝附子湯主之若其人大便堅小便自利者木附
子湯主之

桂枝附子湯方

桂枝四 兩

附子去皮破 生薑切 二兩

大棗拾 摩

甘草炙 二兩

右五味咬咀以水六升煮取二升去滓分溫三服

木附子湯方

附子去皮破白术四兩 生薑切 甘草炙

大棗拾文 教摺

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫三服初一服
其人身如痺半日許後服之都盡其人如冒狀勿怪此以
附子木併走皮內逐水氣未得除故使之耳法當加桂四
兩此本一方二法以大便堅小便自利故去桂也以大便
不堅小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦
宜減服之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小
便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之方

甘草

炙兩

附子

去皮破

白术

參兩

桂枝

去皮四兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

卷之二十一

七

初服得微汗則解能食汗止復煩者將服五合恐一升多
者宜服六七合為始十全云身痺者加防已四兩桂枝小
便不利加伏苓三兩既有附子全加

三生薑兩

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯
主之方

湯

主之方白虎

知母

陸內

石膏

煅裂碎

粳米

陸合

人參

參兩

右五味㕮咀以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服
太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所
致也瓜蒂湯主之方

瓜蒂

枝葉

末

右一味以水一升煮取五合去滓頓服
太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已酒二

然毛聾手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若數其汗則惡寒甚加溫針則數熱甚數下之則淋甚

百合狐惑陰陽毒病脉證并治第三論一首證三條

論曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默欲得臥復不能臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不用聞飲食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若頭不痛漸然者四十日愈若頭快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

治百合病發汗後者百合知母湯方

百合
赤枚 知母
桑白皮 茯苓
甘草

右二味先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煮取一升去滓別以泉水二升煮知母取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫再服

治百合病下之後者百合滑石代赭湯方

百合
赤枚 滑石
赤石脂 代赭
如彈丸 薤白
根 細綿
裹

右三味先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煮取一升去滓別以泉水二升煮滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫再服

治百合病吐之後者百合雞子湯方

百合
赤枚 雞子黃
壹枚

右二味先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煮取一升去滓內雞子黃攪令調分溫再服

治百合病不經吐下散汗病形如初者百合地黃湯方

百合
根莖 生地黃汁
壹升

右二味先以水洗百合瀆一宿當白沫出去其水更以泉水二升煮取一升去滓內地黃汁煮取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合病一月不解變成渴者百合洗方

百合
壹升

右一味以水一斗瀆之一宿以洗身洗已食煮餅勿與鹽豉也

渴不差桔梗牡蠣散主之方

桔梗根
等分 牡蠣
熬

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服

治百合病變發熱一作癢寒熱百合滑石散方

百合
壹兩 滑石
蒸兩

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服當微利者止勿服之熟則除

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦爲逆孤感之爲病狀如傷寒默々欲眠目不得閉臥起不安餌於喉爲感餌於陰爲孤不欲飲食聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝一作甘草漏心湯主之方

甘草
四兩

黃芩
二兩

乾薑
合參

黃連
壹兩

大棗
拾枝

半夏
半升

右七味㕮咀以水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升日

三服

餌於下部則咽乾苦參湯洗之。

餌於肛者雄黃熏之方

雄黃一味為末臘瓦二枚合之燒向肛熏之

病者脉數無熱微煩默但欲臥汗出初得之三四日目亦如鳩眼七八日目四眴黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之方

赤小豆

卷升浸食
茅根暴乾

當歸

春兩

右二味杵為散水服方寸匕日三服

陽毒之為病面目赤斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可治七日不可治陰毒之為病面目青身痛狀如被打喉咽痛死生與陽毒同升麻鼈甲湯並主之方

升麻

二兩

當歸

壹兩

蜀椒

壹兩

鼈甲

如手大一片矣

甘草

丈兩

雄黃

半兩

右六味㕮咀以水四升煮取一升去滓頓服之老小再服取汗陰毒去雄黃蜀椒附後千金陽毒用升麻湯無雄黃甲有桂陰毒用甘草湯無雄黃

瘡病脉證并治第四

證二條方六首

師曰瘡脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也深大者可吐之弦數者風疾也以飲食消息止之

問曰瘡以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解也如其不差當云何師曰此結為癰瘕名曰瘡母急治之宜鼈甲煎丸方

鼈甲拾文

烏扇

卷分

黃芩

卷分

柴胡

陸分

鱗脫肉

鼠婦熬去皮卷分 乾薑參分 大黃參分 药茱五分
桂枝去皮卷分 蒜簷熬去皮 半夏洗去皮 厚朴卷分
牡丹去心卷分 瞿麥炒分 紫葳參分 半夏洗去皮
人參去皮卷分 蘆蟲炒分 阿膠參分 蜂窠四分
赤消治玄燒銀炒 桃仁水分去皮 灼熱焦集
右二十三味爲末取嫩龜下灰一斗清酒一斛五斗浸灰
候酒盡一半着鱗甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸
藥煎爲丸如梧桐子大空心服七丸日三服十全金丹有
海藻三分大戟一分蟻鰐五分無鼠婦
赤消三分以蠶甲、蟻和諸藥爲丸
師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手足熱而欲嘔名
曰癰瘡若但熱不寒者邪氣內藏於心外合分肉之間令人消

要附上

二

溫瘡者其脉如平身無寒但熱骨節疼痛時嘔白虎加桂枝湯
主之方

知母陸丙 甘草炙丙 石膏煅裂碎 糯米陸合

桂枝去皮卷分

右五味㕮咀以水一斗二升煮米熟去滓煎取三升温服
一日三服汗出愈

瘡多寒者名曰牡瘡蜀漆散主之方

蜀漆先去皮 雲母燒之三處龍骨等分

右三味杵爲散未數前以綠水服半錢溫瘡加蜀漆半分
臨數時服一錢匕作雲實

附方

治牡瘡牡蠣湯方

牡蠣熟四兩

麻黃去節四兩

甘草炙兩

蜀漆洗去腥三兩

右四味㕮咀以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內
諸藥煮取二升去滓溫服一升吐則勿更服見外臺

瘧病發渴者與小柴胡去半夏加桔梗湯方

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草炙各一兩

桔梗根四兩

生薑或兩

大棗一枚擘

桔梗根四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日三

見外臺經心

柴胡桂薑湯方

此方治寒多微有熱或因寒不熱眼一劑如神故錄之

桂枝

去皮

黃芩

卷兩

桔梗根四兩

牡蠣熟

甘草炙

乾薑各二兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

裏略六

三

溫服一升日三初服微煩汗出愈

出傷寒論

中風虛節病脉證并治第五

論一首脉證三昧方十一首脚氣附

夫風之為病當半身不遂或但僻不遂者此為痺脉微而數中
風使然寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮
膚浮者血虛絡脉空虛邪不濕或左或右邪氣反緩正氣即
急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不
勝邪入於府即不識人邪入於藏舌即難言口吐於涎
大風四肢煩重心中惡寒不足者候氏寒散主之

方外臺治風癩

菊沈律拾

白朮

各分

細辛

卷分

茯苓

卷分

牡蠣熟

卷分

桔梗

刪分

防風

拾分

人參

卷分

礬石熟

卷分

黃芩

伍分

當歸

卷分

乾薑

卷分

芎宿

卷分

桂枝

去皮

右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服二十日溫酒
下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹
中不下也熟食即下矣冷食自能助藥力外臺有補乳醫
石各三分無桔梗

風引除熱主癱瘓湯方

太黃

乾薑

龍骨各肆

桂枝

去皮兩

甘草炙

牡蠣熱各

石膏

兩

赤石脂

白石脂

石膏

兩

右十二味杵麩篩以草囊盛之取三指撮井華水三升煮

三沸去滓溫服一升

深師云治大人風引少小驚癇瘓瘻

日數十叢醫所不療除熱方

并源脾

引湯風

病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮防已地黃湯主之方
防已壹分桂枝參分防風參分甘草炙分

吳氏二

三

右四味㕮咀以酒一杯漬之一宿絞取汁取生地黃二斤
㕮咀蒸之加米飯久以銅器盛其汁更綏地黃等汁和分
再服

頭風摩散方

大附子

壹枚去皮

鹽等分

右二味爲散沐了以方寸匕摩擦上令藥力行

寸口脉沈而弱沈即主骨弱即主筋沈即爲腎弱即爲肝汗出
入水中如水傷心虛節黃汗出故曰虛節
趺陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自止

少陰脉浮而滑弱則血不足浮即爲風風血相搏即疼痛如掣
盛人脉濡小短氣自汗出虛節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當
風所致

諸肢節疼痛身體魁羸脚腫如脫頭眩短氣溫渴欲吐桂枝芍藥知母湯主之方

桂枝

津兩

芍藥

卷兩

甘草

炙兩

麻黃

去節兩

防風

津兩

生薑

伍兩

白朮

伍兩

知母

津兩

麻黃

去節兩

防風

津兩

附子

去皮破

烏頭

五枚取一升煎取半升加出烏頭

甘草

炙

麻黃

去節

右九味㕮咀以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服病癰節疼痛不可屈伸烏頭湯主之方

烏頭

五枚取一升即出烏頭

甘草

炙

麻黃

去節

芍藥

各一两

黃耆

各一两

右五味㕮咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更

煎之服七合不知盡服之

治脚氣衝心方

吳略上

古

礬石

或兩

桂枝

去皮

當歸

人參

右一味以操水一斗五升煎三五沸浸脚良

附方

續命湯治中風痺身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉倒姚云與大續命同兼治婦人產後去血者及走入小兒方

麻黃

去節

桂枝

去皮

當歸

人參

石膏

辟繩

乾薑

炙

甘草

炙

芎藭

壹兩

杏仁

津拾枚

去皮尖

右九味㕮咀以水一斗煮取四升去滓溫服一升當小汗

薄覆脊憚几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治

但伏不得臥敵逆上氣面目洪腫見古今婦科卷五是仲景方久兩家

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食三

黃陽方

麻黃去節分

獨活肆分

細辛武分

黃耆武分

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫三服一服小汗兩服大汗心熱加大黃二分腹痛加枳實一枚氣逆加人參三分性加牡蠣三分渴加桔梗根三分先有寒加附子一枚金千

治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣木附子湯見陽氣中病

治脚氣土入以腹不仁服八味丸方

山茱萸各肆分

澤鴻

吳茱萸

五

茯苓

牡丹皮各兩

桂枝去皮

附子炮去皮

各壹兩

右八味末之鍊蜜和丸如梧桐子大酒下十五丸日再服加至二十五丸見崔天祐

治肉極熱則身體津脫腰理開汗大泄屬風氣下焦脚弱越婢加木湯方

蘇子

麻黃去節

石膏半斤

生薑

各兩

切

甘草武兩

大棗拾伍枚擘

白朮肆兩

右六味㕮咀以水六升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服惡風加附子一枚炮金千

血痺虛勞病脉證并治第六

論一首證九條

問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之但以脉自微濶在寸口關

上小緊宜針引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽根微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀

黃耆桂枝五物湯主之方

黃耆 奉兩

芍藥 卷兩

桂枝 去皮 卷兩

生薑 切 陸兩

大棗 故掌

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓溫服七合日三服

人參
一方有

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞

男子面色薄者主渴及亡血卒端悸脉浮者裏虛也

男子脈虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利面白時目眩兼衄少腹滿此為勞使之然勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出酸削不能行

男子脉微弱而濡為無子精清冷一作冷

夫失精家必腹弦急陰頤寒目眩一作眶痛脣落脉極虛芤遲為

清穀亡血失精

脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍骨牡蠣湯主之方

桂枝 去皮

芍藥

生薑 切各

卷兩

甘草 炙各

卷兩

大棗 故掌

龍骨

牡蠣 熟各

卷兩

桂枝 陸兩

卷兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升去滓分溫三服

小品云
汗出者除桂加白薇附子

各三分故曰二加龍骨湯子

天雄散亦主之方

天雄 塔兩

炮

白朮 捣兩

桂枝 陸兩

龍骨 卷兩

龍骨 卷兩

右四味杵為散酒服半錢上不知稍增之

男子平人脈虛弱細微者善盪汗也

脉經云盪汗出也

人年五六十其病脉大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠癰者皆爲勞得之

脉經云人年五十
六十七其脉浮大者

脉沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也

脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精

古四條古本並無鄧氏所編金匱方却有之今依補入並見脈經第八卷虛勞脉證第六

虛勞寒急憤劔腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽乾口燥

小建中湯主之方

桂枝

去皮參兩

芍藥

生皮參兩

甘草

炙參兩

生薑

切參兩

芍藥

參兩

大棗

拾皮擘掌

膠鴟

壹升

要略

二

文

右六味㕮咀以水七升煮五味取三升去滓內膠鴟令消溫服一升日三服家不可服此陽以解故也十全大補丸沈重膏肉疫疾吸二少氣行動喘乏胸滿氣急腰背強痛心中虛勞面赤唇燥面體少色或飲食無味肺肋脹脹躁重不舉多臥以起甚者復年輕者百日漸致瘦弱四肢渴財可復常六脉俱不足虛寒乏氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃耆建中

病又有人參二兩

生薑

切各

芍藥

參兩

黃耆

炙參兩

桂枝

去皮參兩

生薑

切參兩

芍藥

參兩

甘草

炙參兩

大棗

拾皮擘掌

膠鴟

壹升

右七味㕮咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠鴟令消溫服一升日三服某腹脹者加生薑腹滿去薑加淡芩二兩半及麻榔蜜酒不足補氣加半

四夏三

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之

方見前

虛勞諸不足風氣百疾署預丸主之方

署預分拾當歸

桂枝去皮

蟻

乾地黃

大豆黃卷

各拾分

甘草或拾削人參赤分

芎藭

芍藥

白朮

麥門冬去心

杏仁去皮尖然柴胡

桔梗

茯苓各伍分

阿膠赤各分

乾薑壹分

白斂或分

防風陸分

大棗

百枚爲膏

右二十一味末之鍊蜜和丸如彈子大空腹酒服十九一
首丸爲劑

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之方

酸棗人式升甘草壹兩

知母式兩

茯苓式兩

要略上

八

右五味收咀以水八升煮酸棗人得六升內諸藥煮取三升去滓分溫三服脈師有生
五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃蘿蔔丸主之方

大黃

拾分

苦芩

式兩

甘草

壹兩

桃人

壹升去皮尖然

杏人

壹升同

芍藥

肆兩

乾地黃

拾兩

乾漆

壹兩

蘼蘆

壹升去

水蛭

壹升

蟾蜍

熬

蟻

壹升

右十二味末之鍊蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

附方

虛勞不足汗出而悶脉結心悸行動如常不出百日危急者十一日死矣甘草湯主之方脉湯復

甘草脾內

桂枝去皮

生薑切各

麥門冬去心半升

麻仁半升

人參或兩

阿膠或兩

大棗去核一枚

生地黃

切一斤

右九味㕮咀以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內

膠消盡溫服一升日三服見附金翼

治冷勞又主鬼疰一門相染獘肝散方

獘肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

見附非仲景方

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證并治第七論

一首脉證四條方一十八首

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病何從得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數又被快藥下利重亡津液故得之

問曰寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者何師曰此為肺

吳略上

丸

瘡之病若口中辟燥欬即胸中隱痛脈反滑數此為肺癰欬唾膿血肺數虛者為肺痿數實者為肺癰

問曰病欬逆脈之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死其脉何類師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時振寒熱之所過血為凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膜成則死

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚

肺痿而喘者屬肺脹欬作風水發汗則愈

以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩甘草乾薑湯以溫其

病方

甘草
炙兩

乾薑
或兩

右二味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分溫再服服湯已小溫覆之若渴者屬消渴

欬而上氣喉中水難聲射干麻黃湯主之方

射干

治喉痙攣宣法參兩

麻黃

肺兩去節

生薑

切兩

細辛

參兩

紫菀

參兩

款冬花

參兩

五味子

半升

半夏

沈氏著削外皮半升

大棗

學

右九味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服

欬逆氣上衝唾濁但坐不得卧皂莢丸主之方

皂莢

蜜燒剝去皮子

要略上

辛

上氣肺浮厚朴麻黃湯主之方

厚朴

炙兩

麻黃

肺兩去節

石膏

大肺子如肺子

杏仁

皮尖去半升去皮尖去

乾薑

或兩

細辛

或兩

小麥

虛升

五味子

半升

半夏

半升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

脉沈者澤漆湯主之方

澤漆

蜜水

半夏

半升

紫參

伍兩作紫菀

桂枝

參兩

澤漆

蜜水

半夏

半升

白前

伍兩

甘草

參兩

黃芩

參兩

人參

參兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升去滓溫服五合至夜盡

大逆上氣喉咽不利止逆下氣者麥門冬湯主之方

麥門冬半升心半夏一升

人參二兩甘草二兩

粳米一合大棗八枚

右六味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓溫服一升日三夜一服

肺癰喘不得臥葶藶大棗鴻肺湯主之方

葶藶熟令黃色橘

大棗一枚

枝擘

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

之

效而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久上吐膿如米

夏枯二

粥者為肺癰桔梗湯主之方

桔梗壹兩

甘草二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升去滓分溫再服則吐膿血也

亦治
喉痺

歎逆倚息此為肺脰其人喘急如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之方

麻黃二兩

去節

石膏半斤

生薑切

蜜酒

大棗八枚

枝擘

擘

擘

擘

甘草

炙

兩

半夏半升

洗

右六味咬咀以水六升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服

肺脰欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍加石膏湯主之方

麻黃

云節

芍藥

細辛

甘草

炙

乾薑

各

五味子

半夏

洗各
半升

石膏

灰

半夏

外臺

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥取三升去滓強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

附方

肺痿延唾多心中溫

上液者灸甘草湯主之

方見虛勢門
中夏外臺

又甘草湯方

甘草

炙

兩

右一味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分溫三服

見千

肺痿敵唾涎沫不止咽燥而渴生薑甘草湯主之方

生薑

伍

人參

各

甘草

肆

兩

大棗

拾

伍

擘

擘

要略上

三

古四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分溫三服

見千

肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯主之方

桂枝

去皮

生薑

卷

兩

甘草

炙

兩

大棗

拾

伍

皂莢

壹

子

矣

焦

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓分溫三服

見千

金匱

千

歟而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久上吐膿如米粥者為肺癰

白散主之方

桔梗

卷

分

貝母

卷

分

巴豆

壹

分

去皮心

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐出在膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定

見外

治肺癰葷湯方

蓑葉切式

薏苡人半升桃人伍拾枚瓜瓣半升

去皮尖瓜瓣半升

右四味以水一斗先煮蓑得五升去滓內諸藥煮取二升分溫再服當吐如膿

金匱千

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛放逆上氣喘鳴迫塞草薢大棗鴟肺湯主之用上方三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑乃進之小青龍湯方

麻黃

去節

桂枝

細辛

甘草

炙

乾薑

各三

五味子

半夏

洗谷半升

芍藥

各兩

右八味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升渴者去半夏加桔梗根三兩微利者去麻黃加茺蔚一雞子大熬噎者去麻黃加附子一枚炮小便不利者去麻黃加茯苓四兩喘者去麻黃加杏仁

人半升

欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣脅下痛引缺盆小青龍加石膏湯主之

方見上並

奔豚氣病

脈證并治第八

方三首

論二首

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之

師曰奔豚病者從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之方

甘草

各一

芎藭

當歸

各二

半夏

津兩

生薑

半兩

生薑

半兩

黃芩

各兩

生葛

伍兩

芍藥

各兩

生薑

半兩

生薑

半兩

甘李根白皮

半升

白皮

切壹

右九味㕮咀以水二斗煮取五升去滓温服一升日三夜

一服

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯方

桂枝伍兩
去皮

芍藥叁兩

生薑壹兩

甘草錢兩

大棗拾伍枚
擘華

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加桂滿五兩所以加桂者以能洩奔豚氣也發汗後其人脣下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之方

茯苓半斤

桂枝肆兩
去皮

甘草壹兩

大棗拾伍枚
擘擘

取三升去滓溫服一升日三服

作甘爛水法

取水三斗置大盆內以杓揚之水上又有珠子五七千顆相逐取用之

胸痺心痛短氣病脉證并治第九論一首證一
條方一十首

師曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也

平人無寒熱短氣不足以息者實也

胸痺之病喘息歎唶胸苦痛短氣寸口脉沈而遲關上小緊數桔梗薤白白酒湯主之方

桔梗實樹壹枚

薤白切半

白酒半升

右三味同煮取二升去滓分温再服

胸痺不得卧心痛徹背者桔樓薤白半夏湯主之方

桔樓實薦一枚切半薤白兩切半半夏半升洗切白酒一斗

古四味同煮取四升去滓温服一升日三服

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿肠下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之方

枳實炙半厚朴炙半薤白切半桂枝去皮一斤

桔樓實薦一枚甘草一斤厚朴兩桂枝去皮一斤

右五味㕮咀以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥者王涕去滓分溫三服

理中湯亦主之方

人參一兩甘草炙乾薑一兩白朮合半

要略上

二三

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

胸痺

胸中氣塞短氣

茯苓去皮一兩杏人去皮尖甘草生薑半斤

右三味㕮咀以水一斗煮取五升去滓温服一升日三服

不差更合服

橘皮枳實生薑湯亦主之方

橘皮壹斤枳實炙半生薑半斤

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分温再服

如辨喉中痰唾如漏噏塞口燥沫是也

胸痺緩急者薏苡人附子散主之方

薏苡人一合伍兩大附子一枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

一云服半錢匕

心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之方

桂枝去皮一两枳實五枚生薑三两

右三味㕮咀以水六升煮取三升去滓分溫三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之方

烏頭炮去皮一两附子炮去皮半两赤石脂一两

乾薑一两蜀椒二两

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不知稍

增之

治九種心痛方

附子炮去皮一两巴豆去皮心一两

生狼牙炙令香一两

人參一两

乾薑一两

吳茱萸一两

要略上

卷

一服弱者二丸兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷腫上氣落馬墜車血瘀等皆主之禁口如常法

腹滿寒疝宿食病脉證并治第十一

腹滿一十八首

趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒症以上也當以溫藥服之

病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下苔下之上也當以溫藥服之

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥

病者腹滿躁而不渴胸中寒實而利不止者死

寸口脉弦者即胸下拘急而痛其人嘔吐惡寒也夫中寒家喜欵其人清涕出較熱色和者善嘔

中寒其人下利以裏虛也。欲嚏不能。此肚中寒。

一云

夾瘦人繞脅痛必有風冷穀氣不行而反下之。其氣必衝。不衝者心下則痞。

病腹滿數熱十日。脉浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之方。

厚朴

半斤
炙

甘草

卷兩
炙

大黃

卷兩
炙

大棗

五枚
擘

枳實

伍枚
炙

桂枝

去皮
丈兩

生薑

伍兩
切

右藥㕮咀以水一斗煮取四升去滓溫服八合日三服。嘔者加半夏五合。下利者去大黃。寒多者加生薑至半斤。腹中寒氣雷鳴切痛。脇脇逆滿嘔吐。附子粳米湯主之方。

附子

皮破八斤
半夏

甘草

壹兩
炙

大棗

擘枚

粳米

半升

右五味㕮咀以水八升煮米熟湯成去滓溫服升日三服。

吳略上
二

腹滿脉數。厚朴三物湯主之方。

厚朴

半斤
炙

大黃

半斤
炙

枳實

伍枚
炙

右藥㕮咀以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升去滓溫服一升。腹中轉動更服。不動勿服。

病腹中滿痛者。此爲實也。當下之。宜大柴胡湯方。

柴胡

捌兩
炙

黃芩

卷兩
炙

芍藥

卷兩
炙

半夏

半升
洗升

枳實

伍枚
炙

大棗

拾枚
擘

生薑

伍兩
切

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升。溫服一方加大黃二兩。若不加恐不名大柴胡也。

腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大承氣湯。

方見症
病中

心胸中大寒痛。嘔不能飲。腹中寒上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之方。

蜀椒 汗

乾薑 腸兩

人參 級兩

右三味㕮咀以水四升去滓內膠鈎一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升許更服當一日食糜溫覆之

脇下偏痛數熱其脉弦緊此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯方

大黃 参兩

附子 巻一枚破細辛 級兩

去皮破細辛

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分溫三服若強人

煮取二升半分三服服後如人行四五里進一服

寒氣厥逆亦丸主之方

茱苓 肝兩

半夏 肝兩洗細辛

作人參金烏頭 大皮炮

炮兩升

附子 壓兩炮

射罔 巻一枚如

去皮

吳略上

十六

右六味末之內真朱為色鍊蜜和丸如麻子大先食酒飲服一丸日再夜一服不知二丸為度

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不飲食弦緊相搏即為寒疝寒疝繞躋痛若數則白汗出手足厥寒其脉沈弦者大烏頭煎主之方

烏頭 治伍枚熟黑不必咀

右一味以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服慎不可一日再服

寒疝腹中痛及腸痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸 参兩

生薑 切兩

羊肉 壓兩

壹斤

右三味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

鄭氏高麗大者五枚
十字必誤記

若寒多者加生薑成一斤。痛多而嘔者加橘皮二兩木一兩。加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之。

寒疝腹中痛逆冷手足不仁者身疼痛灸刺諸藥不能治抵當

烏頭桂枝湯主之方

烏頭伍枝實者去角

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升許初服二合不知即服三合又不知復更加至五合其知者如醉狀得吐者為中病。

桂枝湯方

桂枝去皮

芍藥

生薑

各二兩

甘草

炙一兩

大棗拾枚

枚擘

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓

要略上

羌

附方

烏頭湯主寒疝腹中絞痛。賊風入腹攻五藏拘急不得轉側呻呼發作有時使人陰縮手足厥逆用土台見外臺

夫脉浮而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當下其寒

脉雙弦而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之

寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯主之方

柴胡津兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝去皮

生薑

切各一兩半

甘草

炙一兩

半夏

洗六合

右九味咬咀以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

卒疝走馬湯主之方

巴豆或故去皮心熟

杏人或故去皮火去

右二味取綿纏槌令碎熱湯二合搗取白汁飲之當下老
小量之通治飛尸鬼擊病並見外臺

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反濁尺
中亦微而濁故知有宿食大承氣湯主之方見症

脉緊者如轉索無常者有宿食

脉緊頭痛風寒腹中有宿食不化

一云寸口脈緊

脉數而滑者實也此有宿食下之愈宜大承氣湯方見症

病中用上

下利不欲食者有宿食故也當下之宜大承氣湯方見症

用上

宿食在上管當吐之可與瓜蒂散方

瓜蒂壹分熟黃

赤小豆壹分熟

右二味杵為散取一錢匕以香豉一合熱湯七合煮取汁
和散溫服之不吐者少加之快吐乃止士血虛家不可

要略上

卷上

與之

金匱要略方卷上

8



金匱要略方卷中

漢張仲景述

晉王叔和集

臣林億等註次

上海圖書館藏

世說新語

陔余續編

國朝

五藏風寒積聚病脉證并治第十一

痰飲咳嗽病脉證并治第十二

消渴小便利淋病脉證并治第十三

水氣病脉證并治第十四

黃疸病脉證并治第十五

驚悸衄吐下血胸滿瘀血病脉證并治第十六

嘔吐噦下利病脉證并治第十七

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

趺蹠平指辟腫轉筋狐疝蟲病脉證并治第十九

雜療方第二十

加減柴胡散 訶黎勒丸
急丸 寒食散 救卒丸

要略口

尸體容忤 自經
渴丸 痘丸 烏墮

五藏風寒積聚病脉證并治第十一

論一首
二條方三首

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

肺中寒者吐濁涕

肺充藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死

肝中風者頭目瞞兩脇痛行常嘔令人嗜甘

肝中寒者兩脇不舉舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而汗出也

脉經千金云時盜汗飲食已吐其汁

肝充藏浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死

肝著其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之

臣億等校補本施
覆花湯方本綱

心中風者翕々發熱不能起心中飢而欲食食即嘔吐

心中寒者其人苦病心如攢蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心辭如鹽注其脉浮者自吐乃愈

心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩數熱當脣跳其脉弦此為心藏傷所致也

心元藏浮之實如豆麻按之益躁疾者死

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣寢者為癲陽氣寢者為狂

脾中風者翕^上敷^形熱^形如醉人腹中煩重皮肉瞞^上而短氣

脾元藏浮之大堅按之如覆杯潔^上狀如搖者元^{臣憲等詳五}

中寒令脾只載中國腎中風中寒俱不載者古文簡亂亡失無多古既遠無文可以補續也

趺陽脉浮而濶浮則胃氣強瀦則小便數浮瀦相搏大便則堅

吳略口

其脾為約麻子丸主之方

麻子人_{或外}芍藥半斤

枳實_炙半斤

大黃_生半斤

厚朴_{一寸}

杏仁_生六枚

炙

一右六味末之鍊蜜和丸如梧子大飲服十九日三服漸加以知為度

腎着之病其人身體重腎中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣_{一作裏}冷濕丸得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘草乾薑茯苓白朮湯主之方

甘草_生兩

乾薑_炮兩

茯苓_生兩

白朮_生兩

右四味㕮咀以水五升煮取三升去滓分溫三服腰中即溫腎充藏浮之堅按之亂如轉丸益下入足中者死

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消穀故令噫耳下焦竭即遺溺失便其氣不和不能自禁制不須治久自愈

師曰熱在上焦者因歎為肺痿熱在中焦者則為堅熱在下焦者則溺血亦令淋閉不通

大腸有寒者多驚瘧有熱者便腸垢

小腸有寒者其人下重便血有熱者必痔

問曰病有積有聚有聚氣何謂也師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移為可治聚氣者腸下痛按之則愈復發為繫氣諸積大法脉來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在脣傍上關上積在心下微下關積在少腹尺積在氣衝脉出左積在左脉出右積在右脉

兩出積在中央各以其部處之

痰飲欬嗽病脈證并治第十二

論一首脈證二十一
肺方一十八首

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦水走陽間瀝有聲謂之瀉飲後水流在膈下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼痛謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲

水在心心下堅築上短氣惡水不欲飲

水在肺吐涎沫欲飲水

水在脾以氣身重

水在肝膽下支滿嘔而痛

水在胃心下悸

夫心下有留飲其人背寒冷大如手

留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則輒已一作轉甚

胸中有留飲其人短氣而渴四肢虛節痛脉沈者有留飲

膈上之病滿喘欬唾酸則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振二身躍劇必有伏飲

夫病人辛飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸

微者短氣

脉雙弦者寒也皆大下後喜虛脉偏弦者飲也

肺飲不弦但苦喘短氣

支飲亦喘而不能臥加短氣其脉平也

病痰飲者當以溫藥和之

心下有痰飲胸脇支滿目眩茯苓桂枝术甘草湯主之方

要略中

四

茯苓
半兩

桂枝
去皮
參兩

白朮
參兩

甘草
炙
或兩

利

右四味㕮咀以水六升煮取三升去滓分溫三服小便則

夫短氣有微飲當從小便去之茯苓桂枝术甘草湯主之方

腎氣丸亦主之方見肺氣中

病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂
大者
參救

半夏
拾式救先以水
升煮取半升去滓

芍藥
伍枚

甘草
如指大壹枚

一本無

右四味㕮咀以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

病懸飲者十葉湯主之方

芫花 然

甘遂

大戟 然

右三味擣篩以水一升五合煮大棗十枚煮取八合去滓
內藥強人一錢匕羸人服半錢平旦溫服之不下者明日
更加半錢下後糜粥自養

病溢飲當數其汗宜大青龍湯方

麻黃

陸兩
去節

桂枝

武兩
去皮

甘草

文兩
炙

生薑

參兩
各四

石膏

加雞子
大半升

杏仁

去皮尖
大半升

大棗

拾枚

甘草

文兩
炙

右七味㕮咀以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升溫覆令汗出汗出多者溫粉粉
之一服汗者勿再服若復服汗出多云陽逆虛惡風煩躁
不得眠也

病溢飲者當數其汗宜小青龍湯方見肺

要略中

五

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之方

木防已

肉兩
去皮

桂枝

武兩
去皮

石膏

加雞子
拾枚

人參

連肉
參合

茯苓

各四
兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫再服虛者即
愈實者三日復數復興不愈者宜去石膏加茯苓芒消湯
方

木防已

肉兩
桂枝
去皮

人參

各四
兩

茯苓

各四
兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓內芒消再微煎分
溫再服微利則愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之方

澤鴻 伍兩 白朮 兩

右二味㕮咀以水二升煮取一升去滓分溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之方

厚朴 皮裏尺去皮炙 大黃 陸兩

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分溫再服

支飲不得息葶藶大棗鴟肺湯主之

方見肺

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之方

半夏 洗去皮 生薑 半斤

右二味切以水七升煮取一升半去滓分溫再服

千金云
小半夏

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣防已椒目葶藶大黃丸主之方

苓加芩

要略二

六

防已

椒目

葶藶熟

大黃 各一兩

右四味末之蜜和丸如桐子大先食飲服一丸日三服稍增口中津液止渴者加芒消半兩

半夏 洗去皮

生薑 半斤

茯苓

參四一
方脾兩

右三味切以水七升煮取一升五合去滓分溫再服

假令瘦人臍下有憆者吐涎沫而癲眩水也五苓散主之方

猪苓 去皮削鋸 茯苓 削削 漢鴻 陸銖

白朮 銖削

桂枝 去皮

右五味杵爲散飲服方寸匕日三服多飲燒水汗出即愈

附方

主心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消

痰氣令能食茯苓飲方

茯苓 參兩 人參 參兩 白朮 參兩 生薑 滌兩

枳實 滌兩 橘皮 滌半兩

右六味㕮咀以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之

見外臺出延年

失有支飲家飲煩胸中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯

上方見

上方見

久飲數歲其脉弱者可治實大數者充其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

敵逆倚息小青龍湯主之

方見肺廉中

青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脉微手足厥逆氣從以腹上

要略中

七

衝胸咽手足痺其人面翕然如醉因復下流陰股小便難時復冒可與茯苓桂枝五味子甘草湯治其氣衝方

茯苓 滌兩 桂枝 滌兩 五味子 半升 甘草 滌兩

衝氣即低而反更歎滿者因茯苓五味子甘草去桂加乾薑細辛以治其歎滿方

茯苓 滌兩 五味子 半升 甘草 滌兩 乾薑 滌兩

細辛 滌兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓分溫三服

破滿則止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥此法不當逐渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水方

茯苓 滌兩

五味子 半升

甘草

參兩

乾薑

半兩

細辛 壓兩

半夏 洗半升

右六味㕮咀以水八升煮取三升去滓分溫三服

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐癥故不內麻黃乃內杏人也若逆而內麻黃者其人必厭所以然者以其血虛麻黃發其陽故也方

茯苓

肆兩

五味子

碎半升

甘草

叁兩

乾薑

叁兩

細辛

參兩

半夏

洗半升

杏人

去皮尖

半升

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服

若面熱如醉狀者此爲胃中熱上熏其面令熱加大黃湯和之方

茯苓

肆兩

五味子

碎半升

甘草

參兩

乾薑

參兩

細辛

參兩

半夏

洗半升

杏人

去皮尖

大黃

叁兩

裏略中

六

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服並見千金
先渴却嘔爲水停心下此屬飲家小半夏加茯苓湯主之方見上
厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食即吐下
二不背止

寸口脉浮而遲浮即爲虛遲即爲勞虛則衛氣不足勞則榮氣
竭趺陽脉浮而數浮即爲氣數即消穀而矢堅氣盛則渙數瘦
數即堅堅數相搏即爲消渴

男子消渴小便反多以飲一斗腎氣丸主之

方見脚氣中

脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之

方見癥飲中

渴欲飲水水入即吐者名曰水通五苓散主之

方見上

渴欲飲水不止者文蛤散主之方

文蛤 伍兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引脅中

趺陽脈數胃中有熱即消穀引食大便必堅小便即數

淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴桔梗瞿麥丸主之方

桔梗根
或兩 滾苓
卷兩

署預
卷兩

附子
炮去皮

瞿麥
盧兩

右五味末之鍊蜜和為丸如桐子大飢服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

小便不利蒲灰散主之方

蒲灰
赤分 滾石
卷分

吳略中

九

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散亦主之方

滑石
或分 蒜髮
燒分 白魚
或分

右三味杵為散飲服半錢日三服

茯苓戎鹽湯亦主之方

茯苓
半斤 白术
或兩 戎鹽
彈丸大

右三味㕮咀以水七升煮取三升去滓分溫三服

渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

方見渴病中

脉浮數熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方

猪苓
去皮

滑石
盧兩

茯苓 澤瀉

阿膠
微熬

右五味㕮咀以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊烊

消溫服七合日三服

水氣病脉證并治第十四

論七首脉證五條方八首

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。風水其脉自浮。外證骨節疼痛。其人惡風。皮水其脉亦浮。外證附腫。按之浸指不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。正水其脉沈遲。外證自端石水其脉自沈。外證腹滿。不端。黃汗其脉沈遲。身體較熱。胸滿四肢頭面腫久不愈。必致癱瘓。

脉浮而洪浮則為風。洪則為氣。風氣相擊。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其人多眩。此為黃汗。

太陽病脉浮而緊。法當骨節疼痛。而反不疼。身體反重而酸。其人不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛。發汗得之渴而小便自利。亡津液。故令渴也。

不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痹。胸中窒不能食。反聚痛暮躁不眠。此為黃汗。痛在骨節。故而喘。不渴者。此為脾脹。其狀如腫。發汗即愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。裏水者。一身面目自洪腫。其脉沈小。便不利。故令病水。假如小便自利。亡津液。故令渴也。

趺陽脉當伏。今反緊。本自有寒。疝瘕。腹中痛。醫反下之下之。即胸滿短氣。

趺陽脉當伏。今反數。本自有熱。消穀。小便數。今反不利。此欲作水。

寸口脉浮而遲。浮脉則熱。遲脉則潛。熱潛相搏。名曰沈。趺陽脉浮而數。浮脉則熱。數脉則止。熱止相搏。名曰伏。沈伏相搏。名曰水沈。則絡脉虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。即為水矣。

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行即惡寒水不沾派走
在腸間

少陰脉緊而沈緊則為痛沈則為水小便即難脉得諸沈當責
有水身體腫重水病脉出者死

夫水病大目下有臥蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病水腹大小
便不利其脉沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法
當病水若小便自利及汗出者自當愈

心水者其身重而必氣不得臥煩而躁其人陰腫肝水者其腹
大不能自轉側肠下腹痛時津液微生小便續通肺水者其
身腫小便難時鴨溏脾水者其腹大四肢苦重津液不生但
苦少氣小便難腎水者其腹大腰腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻

上汗其足逆冷面反瘦

吳略中

二

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈
師曰寸口脉沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏趺陽脉伏
水穀不化脾氣衰則驚瘧胃氣衰則身腫少陰脉細男子則小
便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分

問曰病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脉之不言水
反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微歎喘審如師言其脉何
類師曰寸口脉沈而緊沈為水緊為寒沈緊相搏結在關元始
時當微年盛不覺陽衰之後禁衛相干陽損陰盛結寒微動緊
氣上衝喉嚨噎膈下急痛醫以為禹飲而大下之氣擊不去
其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化
面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫復

如前胸脇苦痛象若奔豚其水楊溢則浮散喘逆當先攻擊衝氣令止乃治散歟止其喘自差先治新病當在後

方見風濕中風
風水脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之腹痛者加芍藥

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱者越婢湯主之方

麻黃去節半兩 石膏半斤 生薑切三兩 大棗十二枚擘

甘草炙二兩

右五味㕮咀以水六升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服惡風者加附子一枚炮

古今解驗云風水加氣中脚

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶動者防已菝葜湯

要略中

十二

主之方

防已伍兩

黃耆卷兩

桂枝去皮一兩

菝葜陳內

甘草炙二兩

桂枝去皮一兩

菝葜陳內

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫再服

裏水越婢加木湯主之

方見腳氣中脚

又甘草麻黃湯亦主之方

甘草炙二兩

麻黃去節二兩

右二味㕮咀以水五升先煮麻黃再沸去滓內甘草煮取三升去滓溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

水之為病其脉沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脉沈者宜附子麻黃湯浮者宜杏子湯

附子皮破八斤麻黃去節甘草炙

右三味㕮咀以水七升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八分日三服

杏子湯方未見恐是麻黃杏子甘草石膏湯

厥而皮水者涌汗散王之渴中方見消

師曰黃汗之爲病身體腫一作重一作發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘖汁脉自沈問曰何從得之師曰以汗出入水中浴水後汗孔入得之

黃汗黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之方

黃耆

伍兩

芍藥

五兩

桂枝

去皮長兩

古三味㕮咀以苦酒一升水七升相和煮取三升去滓溫服一升當心煩脈至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也一方用美清醯代苦酒

十三

黃汗之病兩脰自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久之其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輕輕者久之必身瞶瞶即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髓弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃耆五兩湯主之方

桂枝去皮

拾式一枚

生薑

五兩二字

芍藥

各參兩

甘草

或兩

大棗

一枚

黃耆

或兩

右六味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗者更服師曰寸口脉遲而濇遲則爲寒濇爲血不足趺陽脉微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不

利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之方

桂枝去皮

生薑切各

甘草炙

大棗核去

麻黃去節

細辛或兩

附子皮破八片

右七味㕮咀以水七升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取二升去滓分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實木湯主之方

枳實一枚

白朮或兩

六

右二味㕮咀以水五升煮取三升去滓分溫三服腹中硬即當散也

附方

失風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重故知從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之方見風濕中風

臺山深師

黃疸病脉證并治第十五

論二首脉證一
十四條方七首

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃乘熱以行

趺陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為満尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名

曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即穀膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能食時欲吐名

曰酒疸

陽明病脉遲者食難用飽飽則穀煩頭眩必小便難此欲作穀痘雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

夫病酒疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

酒黃疸者或無熱靖言了二腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之

沈弦者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈

酒疸下之久上為黑痘目青面黑心下如噉蒜壅狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

師曰病黃痘誠熱煩喘胷滿口燥者以病發時火劫其汗兩

要略中

五

熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之

脈浮湯欲飲水小便不利者皆發黃

脰滿舌痿黃燥不得睡屬黃家舌痿黃燥作身痿

師曰黃疸病當以十八日為期治之十日以上為差反劇為難治又曰疸而渴者其痘難治痘而不渴者其痘可治發於陰部其人必嘔穀於陽部其人振寒而發熱也穀痘之為病寒熱不食食即頭眩心胷不安久二發黃為穀痘

茵陳蒿湯主之方

茵陳蒿陸兩大黃莖四

梔子桔梗擘掌

右三味㕮咀以水一斗二升煮茵陳減半內二味煮取三升去滓分溫三服小便利渴如皂莢汁狀色正赤一宿腹

減黃從小便去。

黃家曰：肺所發熱而反惡寒，此為女勞得之。膀胱急少，腹滿身
盡黃，額上黑，足下熱，因作黑瘡。其腹脹如水，大便必黑，時溏。
此女勞之病，非水也。腹滿者難治。消石、礬石散主之方。

消石

礬石燒各分

右二味為散。以大麥粥汁和服方寸匕日三服。病隨大小便去小便正黃，大便正黑是候也。

酒黃疽心中懊惱或熱痛，梔子枳實政大黃湯主之方。

梔子

拾肆枝學

枳實

伍枝綿裹

政

壹升綿裹

大黃

壹兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓分溫三服。

師曰：諸病黃家，但利其小便，假令脉浮當以汗解之。宜桂枝加
黃芩湯主之。方見上水病中

要略中

諸黃豬膏煎主之方

豬膏半斤

亂髮如雞子大卷枝

右二味和膏中煎之，發消藥成分再服。病從小便去。

黃疽病茵陳五苓散主之方。一本云茵蕘湯及五苓散並主之

茵陳蒿末伍分

五苓散

伍分

右二物和先飲服方寸匕日三服。五苓散方見痰飲中

黃疽腹滿小便不利而赤自汗出，此為表和裏實，當下之。宜大
黃黃蘗梔子消石湯方。

大黃

半斤

黃蘗各肆

枝伍

梔子

拾伍枚擘

消石

肆兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內消，更煮取一升，頓服。

黃疽病小便色不變，欲自利腹滿而喘，不可除熱，熱除必喰噦。

者小半夏湯主之

方見消渴中

諸黃腹痛而嘔者

宜柴胡湯

必小柴胡湯也

方見後

嘔吐中

男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

方見虛勞中

附方

諸黃瓜蒂湯主之

方見渴病中

刪繁

黃疸麻黃淳酒湯主之方

麻黃

金匱要略

裏

右一味以美清酒五升煮取二升半去滓頤服盡冬月用

酒春月用水煮之

金匱要略

驚悸衄吐下血脅滿瘀血病脉證并治第十六

脉證一十二條

寸口脈動而弱動則爲驚弱則爲悸

方五

要略中

七

師曰尺脉浮目睛暎黃衄必未止暎去目睛慧了知衄今止又曰從春至夏發衄者太陽從秋至冬衄者陽明

衄家不可發汗汗出必額上促急緊直視不能胸不得眠病人面無色無寒熱脉沈弦者衄浮弱手按之絕者下血煩歟者必吐血

夫吐血歟逆上氣其脉數而有熱不得臥者死

夫酒客歟者必致吐血此因極飲過度所致也

寸口脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛相搏此即名爲革婦人則半產漏下男子則亡血

亡血不可攻其表汗出即寒栗而振

病人胷滿唇痿舌青口燥其人但欲漱水不欲嚥無寒熱脉微大來遲腹不滿其人言我滿爲有瘀血

汗出之類上變標字誤作呂字并落一撇字

一翻字上落

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脉反無熱此為陰狀是瘀血也當下之

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨收逆湯主之方

桂枝去皮

生薑切

蜀漆洗去腥

各三兩甘草炙

牡蠣伍兩

龍骨肆兩

大棗拾枚

右七味㕮咀以水八升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨

心下悸者半夏麻黃丸主之方

半夏洗

麻黃去節等分

右二味末之鍊蜜和如小豆大飲服三丸日三服

吐血不止者柏葉湯主之方

莫略中

六

柏葉參四

艾參把

乾薑參兩

右三味㕮咀以水五升取馬通汁一升合煮取一升去滓分溫再服

下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血黃土湯主之方

亦主吐血

甘草炙

乾地黃

白朮

附子

炮八片

阿膠

黃芩各三兩

龜中黃土半斤

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分溫二服近血赤小豆當歸散主之

方見狐惑中

附方

治心氣不足吐血衄血瀉心湯方

大黃

炭兩

黃連

黃芩各一兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升頓服亦治霍亂傷寒論以麻沸湯

見千金之

嘔吐噦下利病脉證并治第十七

論一首 脉證二十一條 方二十三首

夫嘔家有癥腹者不可治嘔腹盡自愈

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家

嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲

問曰病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以穀其汗令陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫

反下之今脉反弦故名曰虛

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胃中冷趺陽脉浮而濇浮則爲虛濇則傷脾脾傷則不磨朝

吳略中

九

食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病難治
病人欲吐者不可下之
噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈
嘔而胃滿者茱萸湯主之方

吳茱萸

壹升人參

壹兩

大棗

拾枚

生薑

陸兩

秋摩

生薑

切兩

右四味㕮咀以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

方見上

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之方

半夏

柒升

黃芩

壹兩

人參

參根

甘草

炙兩

乾薑

四兩

大棗

拾枚

桂枝

一枚

右七味㕮咀以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之方

黃芩卷兩

甘草炙各

大棗拾式

半夏半升

生薑壹兩半切

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服日無夜

一服

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

方見瘦飲中

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之方

猪苓去皮

茯苓

白朮各等分

右三味杵爲散敘服方寸匕日三服

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之方

甘草炙兩

乾薑壹兩

附子皮破生用去

八片

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強

二

人可大附子一枚乾薑三兩

柴胡剝兩

人參

黃芩

生薑切各

半夏半升

大棗拾式

甘草炙

柴胡剝兩

人參

黃芩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日三服

胃反嘔吐者大半夏湯主之方

半夏參外洗

人參卷內切

白芍

壹外

右三味以泉水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取
二升半去滓溫服一升餘分再服

千金云治胃反不受食食入口即吐外臺云治

痞癓者

食已即吐者大黃甘草湯主之方

大黃

脾兩

甘草

壹兩

右二味咬咀以水三升煮取一升去滓分溫再服

外臺又治吐水

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之方

淡芩半斤

澤瀉脾兩

甘草錢兩

桂枝枝皮

白朮

卷兩

生薑

脾兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半

去滓溫服八合日三服

外臺云主消渴脉絕胃吐食又有小麥一升

吐後渴欲得飲而貪水者文蛤湯主之兼主微風脈緊頭痛方

文蛤伍兩

麻黃去節卷兩

甘草錢兩

杏仁伍拾枚去皮尖

石膏

五兩

大棗拾枚

生薑卷兩

切

右七味咬咀以水六升者取二升去滓溫服一升汗出愈乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾薑散主之方

要略中

半夏

洗

乾薑

各等

右二味杵爲散取方寸匕水一升半煎取七合頓服之病人胃中似喘不喘似嘔不嘔似嘯不嘯徹心中憤然無芥者生薑汁半夏湯主之方

生薑汁

壹升

半夏

洗切

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半去滓小冷分四服日三夜一服若一服止停後服乾嘔噦若手足厥冷者橘皮湯主之方

橘皮

肆兩

生薑

半斤

右二味切以水七升煮取三升去滓溫服一升下咽即愈噦逆者橘皮竹茹湯主之方

橘皮

式升

竹茹

卷升

大棗

卷拾

生薑

半斤

甘草

伍兩

人參

壹兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服
夫六府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五藏氣絕於內者利不
禁下甚者手足不仁

下利脉沈弦者下重脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖
發熱不充

下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者尤少陰
負趺陽者為順也

下利有微熱而渴脉弱者全自愈

下利脉數有微熱汗出全自愈設脈緊為未解

下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

下利脉反弦發熱身汗者自愈

吳略中

下利氣者當利其小便

下利寸脉反浮數尺中自瀦者必清膿血

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗
出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利後脉絕手足厥冷時脉還手足溫者生脉不還者死
下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯
攻表宜桂枝湯四逆湯方見上

桂枝湯方

桂皮

去皮

芍藥

生薑

切各

甘草

錢酒

大棗

拾枚擘

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾飲

熱稀粥一升餘以助藥力取微似汗

下利脉三部皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯

方見瘧病中

下利脈遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯

方見瘧病中

下利脉反滑當有所本下乃愈宜大承氣湯

方見瘧病中

下利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯

上方見

下利譏語者有燥屎故也小承氣湯主之方

大黃

脾兩

枳實

參根

厚朴

火兩

右三味㕮咀以水四升煮取一升二合去滓分溫再服一服譏語止若更衣者停後服

赤石脂

壹斤一半末用

乾薑

切兩

粳米

壹升

吳略中

右二味以水七升煮米熟去滓溫取七合赤石脂末一方寸匕和服若一服愈餘勿服熱利重下者白頭翁湯主之方

白頭翁

火兩

黃連

黃芩

秦皮

各壹

右四味㕮咀以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之方

肥梔子

拾

脾兩

救暉

香豉

附合

右二味以水四升煮梔子取二升半內豉更煮取一升去滓分再服溫進一服得快吐止後服

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之方

甘草

火兩

乾薑

可半兩

附子

大者壹枚

皮破入序

生用

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其

脉即出者愈

下利肺痛紫參湯主之方

紫參半斤

甘草參兩

右二味㕮咀以水五升先煮紫參取二升內甘草煮取一升半去滓分溫三服

葛非仲景方

主氣利訶梨勸散方

訶梨勸

拾枚以瓶裏燒灰火中研之令細熟去核

右一味細爲散粥飲和頓服之

葛非仲景方

附方

治大便不通喘數譎語小承氣湯王之

方見上見千金翼

乾嘔下利

黃芩湯王之方

王叔經云人參黃芩湯

要略中

舌

黃芩

人參

乾薑各參兩

桂枝去皮兩

大棗拾枚

半夏洗半升

右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

見外臺

瘡癰腸癰浸淫病

脈證并治第十八

脉證三條論首方五首

諸浮數脉應當發熱而反迺漸惡寒若有痛處當發其癰

師曰諸癰腫欲知有膿與無膿以手掩腫上熱者爲有膿不熱

者爲無膿

腸癰之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無

熱脉散此爲腸內有膿薏苡人附子敗醬散主之方

薏苡人附子敗醬散方

王叔經云人附子去皮

敗醬伍分

右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下

腸癰者以腹腫痞按之即痛如淋小便自調時數熱自汗出

復惡寒其脉遲緩者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成

不可下也大黃牡丹湯主之方

大黃肆兩牡丹壹兩

桃人伍拾枚去皮尖瓜子半升

芒消叁合

右五味㕮咀以水六升煮取一升去滓內芒消再煎一沸
頓服之有膿當下如無當下血

問曰寸口脉浮微而濶法當亡血若汗出設不汗者云何答曰
苦身有瘡被刀器所傷亡血故也病金瘡王不留行散主之方

王不留行拾分八日采之

桑東南根如指大白皮梢分三月三日采

蜀椒各分去目及口若汗

甘草拾分

七日采之

蒲蘽細葉拾分七月采之

甘草拾分

七日采之

黃芩拾分

製附中

註

乾薑或分拾分

芍藥或分

厚朴或分

右九味桑東南根以上三味燒爲灰存性勿令灰過各別
杵篩合治之爲散病者與方寸半服之小瘡即粉之中大
瘡但服之產後亦可服如風寒桑根勿取之前事物皆陰
乾百日

排膿散方

枳實拾分

芍藥大分

桔梗或分

右三味杵爲散取雞子黃一枚取散與雞黃等揉和令相
得飲和服半日一服

排膿湯方

甘草或分

桔梗參兩

生薑壹兩切

大棗拾枚擘

右四味㕮咀以水三升煮取一升去滓溫服五合日再服

浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治黃連粉主之方見未

趺蹠手指辟脛轉筋陰狐疝蛇蟲病脉證并治第十九

論一首脉證二條方四首

師曰病者趺躉其人但能前不能却刺腨入二寸此太陽經傷也病人常以手指辟脛動此人身體觸者藜蘆甘草湯主之見方末

見方末

轉筋之為病其人辟脚直脉上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之方

雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和溫服

陰狐疝氣者偏有小大時上下蜘蛛散主之方

吳略中

三

蜘蛛拾肆枚桂枝半兩

去皮

右二味為散取八分一匕飲和服日再服蜜丸亦得問曰病腹痛有蟲其脉何以別之師曰腹中痛其脉當沈若弦反洪大故有蜘蛛

蛇蟲之為病令人吐涎心痛數作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之

甘草

炙兩

粉

壹兩

蜜

肆兩

右三味咬咀以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止

蛇厥者其人當吐蛇令病者靜而復時煩者此為藏寒蛇上入其腸故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛇閼食臭出其人常自吐蛇蛇厥者烏梅丸主之方又主之方又主之方又主之方

烏梅枝

細辛

乾薑

黃連

當歸

附子

蜀椒

桂枝

太參

黃藤

右一十味各異擣篩合治之以苦酒瀆烏梅一宿去板蒸之五斗米下飯熟擣成泥和藥相得內臼中興蜜杵三千下丸如梧桐子大先飲服十九日三服稍加二十九

襍療方第二十

證一條方二十首論一首

宣通五藏虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三月

柴胡

白木

陳橘皮

伍分

大腹積郴

生薑

桔梗

柒分以上並用大分

春三月

加枳實

甘草

共六味

夏三月

加生薑

枳實

共六味

吳門止

共八味

秋三月

加陳橘皮

共六味

右藥各咀咀分爲三貼一貼以水三升煮取二升去滓分溫三服如人行三四里進一服如四體壅添少許甘草每一貼分作三小貼一小貼以水一升煮取七合去滓溫服再合滓爲一服重煮都成四服

趙非仲景方

長服訶梨勒丸方

訶梨勒

陳橘皮

厚朴

卷分

各壹兩去皮各

右三味末之鍊蜜丸如梧桐子大酒飲服二十丸加至三十丸日二服

葛非仲景方

三物備急丸方

附方

大黃

乾薑

巴豆

各壹兩去皮心

右藥各須精新先擣大黃乾薑爲末研巴豆內中合治一

火候水谷酒名字蒙雷

千杵用爲散藥和爲丸亦佳器中貯之莫令歇主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣口噤停尸卒死者以燙水若酒服大豆許三四丸或不下捧頤起灌令下咽須臾差如未差更與三丸當腹中鳴即吐下便差若口噤亦須折齒灌之見于金云司空裴秀爲散用亦可先和成

汗乃傾口中令後出古今錄驗并時用方見上

當間得入至食驗

急散治人卒上氣呼吸氣不得下喘逆服半匕差後已爲常

用後宮秦用方見上

紫石寒食散治傷寒令之愈不復方

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳

雄鍊

桔梗根

防風

桔梗

文蛤

鬼臼

吳略口

太一餘糧燒各乾薑拾分

附子炮去皮

桂枝

去皮各津分

右一十三味杵爲散酒服三方七金翼

救卒死方

擣薤汁以灌鼻中

又方

割雉雞冠血管吹內鼻中

又方

猪脂如雞子大苦酒一升煮沸以灌喉中

又方

以雞肝及血塗面上灰圍四疊立起

又方

大豆二七枚以雞子白并酒和盡以吞之

救卒死而壯熱者方

礮石半斤水一斗半煎消以瀆脚令浸踝

救卒死而目閉者方

騎牛臨面擣薤汁灌耳中吹皂莢末鼻中立効

救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散有巴豆
者

救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞
筋黃也

一升溫酒灌口中炎心下一寸臍上三寸臍下四寸

各一百壯差

救小兒卒死而吐利不知是何病方

禹屎一丸絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁

尸麌脉動而無氣氣閉不通故靜而死也方

以昌蒲屑內鼻兩孔中吹之令入以桂屑着舌下

脈

在上卷第
一篇中

吳略曰

五

又方 刷取左角麌方寸燒末酒和灌令人喉立起

救卒客忤死千金方云主卒忤鬼夢寐尸諸竈忽氣絕無復

不下者分病人臍左右提搘肩引之藥

下復增取盡一升須臾立蘇名還保湯

麻黃參兩去節

杏人

去皮尖柴拾枚

甘草

參半兩

右三味㕮咀以水八升煮取三升去滓分令咽之通治諸

感忤汗金用桂

又方

桂枝壹兩去皮

生薑叁兩切

梔子拾肆枚擘

豉半升

右四味㕮咀以酒三升微煮之味出去滓分服取差

又方

韭根壹把

烏梅枝皮一束

吳茱萸炒半升

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沈

者充煮取三升去滓分飲之

救自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之方

徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以腳踏其兩肩手少挽其髮常弦勿縱之一人以手按據胷上數動之一人摩捋臂脰屈伸之若已僵但漸強屈之并按其腹如此一坎頃氣從口出呼吸眼闢而猶引按莫置亦勿苦勞之須臾可少桂湯及粥清含與之令濡喉漸能嚥及稍止耳向令兩人以管吹其兩耳彌好此法最善無不沾者

凡中暎死不可使得冷得冷便死療之方

要略中

平

屈革帶繞暎人臍使三兩人更溺其中令溫亦可用熱泥土屈草亦可扣瓦榼底按及車缸以着暎人臍上取令溺不得流去此謂道路窮卒無湯當令人溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不用泥及車缸恐此物冷暎既在夏月得熱泥土暖車缸亦可用也

溺死方

取竈中灰石餘以埋人從頭至足水出七孔即活

凡療自縊溺暎之法並出自張仲景為之其意理殊絕殆非常情所及本草所能關實救人之大術矣傷寒家別有暎病非此遇熱之暎見外臺時後同馬墜及一切筋骨損方

大黃蘆菔切浸水如手大

紺帛燒灰

久用炊單布用宣火

亂髮如雞子大燒灰桃人脾拾玖枚去皮尖蒸熟敗蒲宣提長卷寸甘草如中指節灸封

右七味以童子小便量多以煎湯成酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剗敗蒲席半領煎湯浴衣被裹服斯須通利數行痛楚立差利及浴水赤勿怪即瘀血也見肘後

金匱要略方卷中

要略中

主

入

金匱要略方卷下

漢張仲景述 晉王叔和集 臣林億等詮次

婦人妊娠病脉證并治第二十一

婦人產後病脉證并治第二十二

婦人雜病脉證并治第二十三

禽獸蟲魚禁忌并治第二十四

果實菜穀禁忌并治第二十五

婦人妊娠病脉證并治第二十一

證三條 方八首

師曰：婦人得平脉，陰脉小弱，其人渴不能食，無寒熱，名為軀桂枝湯主之。法六十日當有娠，設有醫治逆者，却一月加吐下者則絕之。利中

婦人妊娠經斷三月而得漏下，下血四十日不止，胎欲動在於

要略下

一

臍上此為妊娠，六月動者，前三月經水利時胎也，下血者，後斷三月衃也。所以下血不止者，其癥不去故也。當下其癥，宜桂枝茯苓丸方。難本云：婦人宿有癰癧，經斷未及三月而得漏下不止，胎動於胎上者，為癰癧害。

桂枝 茯苓

牡丹

桃人

去皮尖

芍藥

分等

右五味木之鍊蜜和丸，如兔屎大，每日一丸，不知加至三丸。

婦人懷娠六月七月，脈弦數熱，其胎踰腹，腹痛惡寒者，必腹如扇之狀，所以然者，子藏開故也。當以附子湯溫其藏。方未見

師曰：婦人有漏下者，有半產後因續下血都不絕者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，為胞阻，膠艾湯主之方。

阿膠

芎藭

甘草

炙各

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

乾地黃

各二兩

艾葉

右七味㕮咀以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠

令消盡溫服一升日三服不差更作

一方加芫荽一兩胡洽治婦人胎動熱乾薑

婦人懷娠腹中病痛當歸芍藥散主之方

當歸
脾兩半斤

芍藥
壹升

茯苓
肆兩

白术
脾兩

澤瀉
半斤

芎藭
半斤

各一兩

人參
各壹兩

半夏
半斤

洗淨

婦人妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸方
右六味杵爲散取方寸匕酒和日三服

乾薑

人參

各壹

半夏

半斤

右三味末之以生薑汁和爲丸如梧子大飲服一丸日三服
婦人妊娠小便難飲食故當歸貝母苦參丸主之方

當歸

貝母

苦參

各肆兩

右三味末之鍊蜜和丸如小豆大飲服三丸加至十九男

要略下

二

子加滑石半兩

婦人妊娠有水氣身重小便不利酒淋惡寒起即頭眩葵子淡芩散主之方

葵子

壹升

茯苓

卷兩

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服小便利則愈

婦人妊娠宜服當歸散方

當歸

半斤

黃芩

卷兩

芍藥

半斤

芎藭

半斤

白术

半斤

右五味杵爲散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服即易產

胎無苦疾產後百病悉主之

附方

妊娠養胎白术散方

白朮 白木

芍藥 分肆

蜀椒 汗分

牡蠣 汗分

然分

右四味杵為散酒服一錢。二日三夜一服。但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芍藥。心煩吐痛不能飲食加細辛一兩半夏錢大二十枚服之後更以醋樣水服之若嘔亦以醋樣水服之復不解者小麥汁服之已後若渴者大麥粥服之病雖愈盡服之勿置。古今解驗

婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺鴟宮及關元小便利則愈。見王

婦人產後病脉證并治第二十二

論一首 譜六條方十七首

問曰新產婦人有三病一者病產二者病鬱冒三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病產何故鬱冒師曰

要略下

三

七血復汗寒多故令鬱冒何故大便難師曰七津液胃燥故大便難產婦體其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者六陰血虛陽氣獨厥故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡湯主之方見溫中止病解能食七八日而更發熱者此為胃熱氣實大承氣湯主之

病中見症

婦人產後腹中疼痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足方見寒

病中見寒

枳實令黑勿過芍藥

等分

右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰脹以麥屑粥下之

方見症

婦人產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之

病中見寒

右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰脹以麥屑粥下之

師曰產婦腹痛法當與枳實芍藥散假令不愈者此爲腹中有
乾血著脣下與下瘀血湯服之主經水不利若瘀血方

右三味末之鍊蜜和爲丸以酒一升煎二丸取八合頓
服之新血利下如豚肝

大黃

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

桃人

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

桃人

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

去皮水蜜蠻蟲

婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便四五日趺陽脉微實再倍其人發熱日晡所煩躁者不食食即讞語利之即愈宜大承氣湯熱在裏結在膀胱也

方見症病中

婦人產得風續之數十日不解頭微痛惡寒時有熱心下堅乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳可與陽旦湯即桂枝湯是也

方見症病中

中下利

鄧氏本得作

後聖作

作

作

作

作

作

婦人產後中風敷熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之方

要略下

四

竹葉

壹把

葛根

壹兩

防風

壹兩

桔梗

一

桂枝

去皮

人參

各

甘草

壹兩

附子

壹枚炮去

大棗

拾伍枚擘

生薑

伍兩

切

右十味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分溫三服溫覆使汗出頸項強用大附子一枚破之如豆大煎藥搗去沫嘔者加半夏半升洗

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之方

生竹茹

或分

石膏

研

桂枝

壹分

去皮

甘草

柒分

白薇

壹分

右五味末之棗肉和丸如彈丸大以飲服一丸日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實一分

婦人產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之方

白頭翁

水兩

黃連

蘆皮

秦皮

各水兩

甘草

水兩

阿膠

水兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令消盡分溫三服

附方

婦人多在草蓐得風四肢苦煩熱皆自發露所為頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩與三物黃芩湯

見小柴胡湯方

黃芩

水兩

苦參

水兩

乾地黃

水兩

古藥㕮咀以水八升煮取二升去滓溫服一升多吐下衄見金匱治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸氣或苦少腹拘急攀痛引腰背不能食飲產後一月日得服四五劑為善令人強壯內補當歸建中湯方

要略下

當歸

水兩

桂枝

水兩

芍藥

水兩

生薑

水兩

切

甘草

水兩

大棗

水兩

桂枝

水兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服一日令盡若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上暖令飴糖消若無生薑則以乾薑代之若其人去血過多崩傷內効不止加地黃六兩阿膠二兩合八種湯成去滓內阿膠若無當歸以芍藥代之

鏡千

婦人雜病脉證并治第二十三

脉證合一百四條論

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其必結故使如瘡狀發作用時小柴胡湯主之

方見嘔吐中止

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

婦人中風發熱寒經水適來得七八日。熱除脉遲身涼和。胸
脇下滿如結胸狀讌語者。此爲熱入血室也。當刺期門隨其實
而取之。

陽明病下血讌語者。此爲熱入血室。但頭汗出當刺期門隨其實
而實而馮之。澈然汗出愈。

婦人咽中如有炙蠻半夏厚朴湯主之方

半夏姜升 厚朴姜升 茯苓脾兩 生薑切伍兩

乾姜蘇葉或兩

右五味㕮咀以水七升煮取四升去滓分溫四服日三夜

一服

一作治胸滿心下堅。咽中佔佔如有炙肉味之不出。吞之不下。下

婦人藏燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數次。俾甘草小麥大棗
湯主之方

要略下

六

甘草參兩 小麥壹升

大棗拾枚

右三味㕮咀以水六升煮取三升去滓分溫三服亦補脾
氣

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫宜小青龍
湯方見肺腫中

湯止乃治痞宜馮心湯方見驚悸

婦人之病因虛稍入結氣爲諸經水斷絕至有歷年血寒積結

胞或寒傷經絡凝堅在上區吐涎唾久成肺癰形體損分在中

盤結繞脣寒疝或兩脇疼痛與藏相連或結熱在中痛在關元

脈數無瘡肌若魚鱗時着男子非止女身在下未多經候不勻

令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝急痛腰脅疼痛

或奄忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼
神火則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脉陰陽虛實緊

弦行其針藥治危得安其雖同病脉各異源子當辨記勿謂不然

問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急痛腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之方

吳茱萸卷兩當歸

芍藥

芍藥各兩

麥門冬去心生薑

甘草

甘草炙各

桂枝去皮

桂枝

桂枝去皮兩

阿膠

右一十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分溫三服亦主婦人少腹寒久不作軀兼主崩中去血或月水來過多及過期不來

要略下

七

婦人帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散主之方

土瓜根 芍藥

桂枝

桂枝去皮

廣蠟

廣蠟熱各

右四味杵為散酒服方寸匕日三服陰頗腫亦主之

寸口脈弦而大弦則為瘕大則為丸瘕則為寒丸則為虛虛寒相搏脉即名為革婦人則半產漏下旋復花湯主之方

旋復花卷兩

葱

桔梗

桔梗一束

新絳少許

右三味以水三升煮取一升去滓頓服之

婦人陷經漏下黑不解勝薑湯主之

臣億等據諸本無勝薑勝恐是前妊娠中勝艾湯也

婦人少腹滿如敦敦音樣狀小便微難而不渴生後者此為水與血並結在血室也大黃甘遂湯主之方

大黃脾兩

甘遂或兩

阿膠或兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓頓服其血當下

婦人經水不利抵當湯主之方

水蛭卷拾枚熬去蟄

蟲蠶卷拾枚去蟻

桃人

皮尖熱去枝去

大黃

卷兩

右四味㕮咀以水五升煮取三升去滓溫服一升當血下
不下再服亦治男子膀胱滿急有瘀血者

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石丸主之方

礬石燒

卷分

杏人

皮火熬

宣分去

火熬

有二味末之鍊蜜和丸如棗核大內藏中劇者再內之
治婦人六十二種風兼主腹中血氣刺痛紅藍悅酒方

紅藍花

卷大

右一味以酒一大升煎強半頓服不止再服

趣排仲景方

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

方見妊娠中

婦人腹中痛小建中湯主之

方見妊娠中

要略下

八

問曰婦人病食飲如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此病轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸以中有茯苓故也

方見脚氣中

溫陰中坐藥蛇牀子散方

蛇牀子人

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裏內之自然溫矣

師曰少陰脉滑而數者陰中即生瘡
婦人陰中蝕瘡爛狼牙湯洗之方

狼牙卷兩

右一味㕮咀以水四升煮取半升以綿纏筋大如繭浸湯
瀝陰中日四遍

師曰。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏緩煎導之。見黃痘中

小兒疳蟲薰菌方

雄黃

葶苈

各少許

右二味末之。取臘月猪脂和鑑。以槐枝綿裹頭四五枚。點藥烙之。

景芳仲擬非仲

禽獸蟲魚禁忌并治第二十四

論辨二首合九十一法方二十二首

凡飲食滋味。以養於生。食之有妨。反能為害。自非服藥鍊液焉。能不飲食乎。竊見時人不閑調攝。疾疢競起。莫不因食而生苟全。其生痕知切忌者矣。所食之味。有與病相宜。有與身為害。若得宜則益體。害則成災。以此致危。例皆難療也。凡煮藥飲汁。以解毒者。雖云救急。不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。春不食肝。

要略下

九

夏不食心。秋不食肺。冬不食腎。四季不食脾。

辨曰。春不可食肝者。為肝氣盛。王脾氣敗。若食肝。又補肝。脾氣敗尤甚。不可救。又肝王之時。不可以死氣入肝。恐傷魂也。若肝不是王時。有虛。以肝補之。佳。餘藏準此。

凡肝藏。自不可輕噉。自充者彌甚。

諸心皆為神識所含。勿食之。使人來生。復其對報矣。

凡肉及肝落地不着塵土者。不可食之。

諸肉自動者。不可食之。

諸肉及魚狗不喫。鳥不啄者。不可食之。

暴肉不乾。火炙不動。見水自動者。不可食之。

肉中有如米點者。不可食之。

六畜肉熱血不斷者。不可食之。

父母及身本命肉食之令人神魂不安

食肥肉及熟羹不得飲冷水

諸五藏及魚投地塵土不汚者不可食之

穢飯餕肉臭魚食之皆傷人

自死肉口閉不可食之

六畜自死皆疫死則有毒不可食之

獸自死北首及伏地者食之殺人

食生肉乾飲乳變成白蟲白蟲一作血蟲

丙午日壬子日勿食諸五藏

疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積耳利兼下之

肺藏米瓮中有毒及經夏食之致胃病

治食自死六畜肉中毒方

擣黃藥屑服方寸匕

食蠱肉漏脯中毒方

燒大麻酒服方寸匕多飲人乳汁亦良飲生韭汁三升亦

得蠱肉密器蓋之隔宿者是也漏脯茅屋漏下沾着者是也

黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煮汁飲數升即解亦治狸肉漏脯等毒

食生肉中毒方

掘地深三尺取其下土三升以水五升煮五六沸澄清汁飲一升立愈

食六畜鳥獸肝中毒方

水浸破絞取汁服數升愈

馬腳無夜眼者不可食之

食駿馬肉不飲酒殺人

馬肉不可熟喫傷人心

馬鞍下肉食之殺人

白馬黑頭者不可食之

白馬青蹄者不可食之

白馬黑蹄者不可食之

馬肉炙肉共食飽醉臥大忌

驢馬肉合猪肉食之成霍亂

馬汗及毛不可人食中害人

馬肝有毒食之殺人未死者方

雄鼠屎

卷赤枚
尖者是

右一味末之水和服之日再服

要略下

又方 取人垢一方寸匕服之佳

食馬肉中毒欲死方

香豉

卷丙

杏人

火去
皮去

右二味蒸一食須熟杵之服日再令盡

又方 煮蘆根汁飲之良

疫死牛或目赤或黃食之大忌

牛肉共猪肉食之必作寸白蟲

青牛腸不可合大肉食之

牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去之勿食損人

牛羊豬肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹內生蟲

噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也食之欲

丸方

飲人乳汁一升立愈

又方 以泔洗頭飲一升愈

又方

牛肚細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出者愈
食牛肉中毒方

甘草煮汁飲之即解

羊肉其有宿熟者不可食之

羊肉不可共生魚酪食之害人

羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癱

白羊黑頭食其腦作腸癱

羊肝共生椒食之破人五藏

猪肉共羊肝和食之令人心悶

要略下

猪肉與生胡荽同食爛人脣

豬脂不可合梅子食之

豬肉和葵食之令人少氣

豚肉不可和蒲白作羹食之發惡瘡

麋脂及梅李子苦姪婦人食之令子青盲男子傷精

麝肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人

痼疾人不可食熊肉令終身不愈

白犬自死不出舌者食之害人

食狗鼠餘令人發癰瘡

洞下方

杏人皮膚升合

右一味以沸湯三升和絞取汁分三服利下肉片大驗

婦人妊娠不可食兔肉山羊肉又不得食鷺雞鵝令子無音聲

免肉不可合白雞肉食之令人面癩黃

兔肉著乾薑食之成霍亂

凡鳥自死口不閉翅不合者不可食之

諸禽畜肝青者食之殺人

雞有六翮四距者不可食之

烏雞白首者不可食之

雞不可共胡蒜食之帶氣雞子

山雞不可合鳥獸肉食之

雉肉久食令人瘦

鴨卵不可合鶯肉食之

要略下

三

婦人妊娠食雀肉令子癩亂無心

雀肉不可合李子食之

勿食燕肉入水爲蛟龍所噉

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

煮大豆及藍汁服之解

魚頭正白如連珠至背上食之殺人

魚頭中無總者不可食之殺人

魚無腸膽者不可食之三年陰不起女子絕生

魚頭似有角者不可食之

魚目合者不可食之

六甲日勿食鱗甲之肉

魚不得合雞肉食之

魚不得合鷓鴣肉食之

鯉魚鮓不可合小豆蔻食之其子合猪肝食之害人

鯉魚不可合犬肉食之

鯽魚不可合猴雉肉食之

合鷄肺可

鯁魚合豚肉生食令人筋甲縮

青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥中食之

鱠鱠不可合白犬血食之

龜肉不可合酒果子食之

又說不可合王家形者當作字設
鼈目凹陷者及厭下有王字形者不可食之其肉不得合雞鴨

子食之

鼈鳖肉不可合莧菜食之

蝦無須及腹下通黑魚之反白者不可食之

異時下

酉

食鱠喫乳酪令人腹中生蟲爲瘕

鱠食之在胃中心間不化吐復不出速下除之久成癥病方

橘皮

壹兩

朴消

壹兩

大黃

或兩

右三味切以水一大升煮至小升去滓頓服即消

食鱠多不消結爲癥病治之方

馬鞭草搗汁飲之或以薑葉汁飲一升亦消又可服吐藥

吐之

食魚及食毒兩種煩亂治之方

橘皮濃煮汁服之即解

食鮓鱠魚中毒方

蘆根煮汁服之即解

解目相向足班目赤者不可食之

食蠅中毒方

紫蘇濃煮汁飲之三升。紫蘇子搗汁飲之亦良。

又方

飲冬瓜汁二升亦可。食冬瓜

凡蠅未遇霜多羣其熟者乃可食之。

蜘蛛落食中有毒勿食之。

凡峰蠅蟲蟻等多集食上喫之致癢

果實菜穀菜忌并治第二十五方八十一法

果子生食生瘡

果子落地經宿蟲蟻食著人喫大忌

生果停畱多日有損傷喫之傷人

桃多食令人熱仍不得入水浴令人病淋瀝寒熱病

主

杏酪不熟傷人

梅多食壞人齒

柰不可多食令人臚脹

林檎不可多食令人百脉弱

橘柚多食令人口爽不知五味

梨不可多食令人寒中金瘡產婦亦不宜食

櫻桃杏多食傷筋骨

安石櫻不可多食損人肺

胡桃不可多食令人動疾飲

生棗食令人熱渴氣脹寒熱羸瘦者彌不可食傷人

食諸果中毒治之方

猪骨燒過末之水服方寸匕亦治馬汗漏脯等毒

木耳赤色及仰生者勿食

菌仰卷及赤色者不可食

食諸菌遇毒悶亂欲死方

人糞汁一升飲之即活服諸吐利藥亦佳服土綠一二升亦可濃煮大豆汁飲之並解

食楓樹菌而笑不止亦以前方治之

誤食野芋煩毒欲死其野芋根生東人名魁芋人種三年不收亦成野芋並殺人亦用前方治之

蜀椒閉口者有毒誤食之戰人咽喉氣欲便絕或吐下白沫人體痺冷者急煮桂汁飲之多飲冷水一二升或食蒜或服地綠或濃煮豉汁解之

正月勿食生葱令人面上起游風

二月勿食蓼傷人腎

三月勿食小蒜傷人志性

四月八月勿食胡荽傷人神

五月勿食韭令人乏氣力

六月七月勿食茱萸傷神氣

八月九月勿食薑傷人神

十月勿食椒損人心傷血脈

十一月十二月勿食薤令人多涕唾

四季勿食生葵令人飲食不化發宿病非但食中藥丸湯散中亦不可用宜潔慎之

時病差未健食生菜手足必腫夜食生菜不利人

十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼或發心癢瘡
發時手足十指爪皆青困委

葱韭初生牙者食之傷人心氣

飲白酒食生韭令人病增

生葱不可共蜜食之殺人獨顆蒜彌忌

棗合生葱食之令人病

生葱和雄雞雉白犬肉食之令人七竅經年血流

食糖蜜後四日內食著生葱韭令人心痛

夜食諸薑蒜葱等傷人心

蕪菁根多食令人氣脹

薤不可共牛鴨作羹食之成痕病非然

尊多食動痔疾

野苣不可同蜜食作內痔

白苣不可共酪同食作蘆蟲

黃瓜食之發熱病

葵心不可食傷人葉尤冷齒背赤莖者勿食之

胡荽久食之令人多忘

病人不可食胡荽及黃花菜

芋不可多食動病

妊娠婦人食薑令子餘指

蓼多食教心痛

蓼和生魚噉之令人嘔氣陰板疼痛

芥菜不可共兔肉食之成惡邪病

小蒜多食傷人心力

食蒜或躁方

濃煮豉汁飲之

鉤吻與芹菜相似誤食殺人解之方

時後方云與薑
萸食芥相似薑

薜荔

利兩

右一味以水六升煮取二升去滓分爲二服其鉤吻生地傍無佗草其莖有毛以此別之

菜中有水薺苔葉圓而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之方

甘草煮汁服之即解

凡春秋二時龍帶精入芹菜中人過食之爲病歲時手青膜滿痛不可忍咬龍病方

服硬糖二三升日兩度吐出如嘶鴟三五枚差

晏昭下

食苦瓠中毒方

黍稷煮汁敷服之解

篇豆寒熱者不可食之

久食小豆令人枯燥

食大豆膚忌敗猪肉

大麥久食令人作癖

白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之

蕎麥麴多食之令人緩落

鹽多食傷人肺

食冷物冰人齒食熱物勿飲冷水

飲酒食生蒼耳令人心痛

夏月大醉汗流不得冷水洗著身及使扇即成病

飲酒勿炙腹背大忌令人腸結

醉後勿飽食後寒熱

飲酒食猪肉臥林稻穰中設黃

食錫多飲酒大忌

凡酒及水照見人影動者不可飲之

醋合酪食之令人血瘕

食白米粥勿食生蒼耳成走疰

食甜粥已食鹽即吐

犀角筋攬飲食沫出及澆地墳起者食之殺人

凡飲食中毒煩滿治之方

苦參切一兩半升

苦酒壹升半升

右二味煮三沸三上三下去滓服之吐食出即差或以水煮亦得

又方

犀角湯亦佳

治食食多不消心腹堅滿痛方

鹽壹升

水叁升

右二味煮令鹽消分爲三法當吐出食便差

譽石生入腹破人心肝當陸以水服殺人譽石亦禁水

尊麌子傳頤瘡藥氣入腦殺人

苦棟無子者殺人

凡諸毒多是假毒藥以投之知時宜煮甘草薺莖汁飲之通除

諸毒藥

金匱要略方卷下

國子監

准 監闈准 尚書禮部符准 紹聖元年六月二十五日

勅中書省尚書省送到禮部狀據翰林醫學本監三學看治任仲言狀伏覩 本監先准

朝旨開雕小字聖惠方等共五部出賣并每節鎮各十部餘州各五部本處出賣今有千金翼方金匱要略方王氏脉經補注本草圖經本草等五件醫書日用不可闕本監雖見印賣皆是大字醫人往往無錢請買兼外州軍尤不可得故乞開作小字重行校對出賣及降外州軍施行本部看詳欲依國子監申請事理施行伏候指揮六月二十三日奉

聖旨依奉

勅如右牒到奉行 都省前批六月二十六日未時付禮部施

公匱要略口譯

行仍合屬去處主者一依

勅命指揮施行

紹聖三年六月 日雕

集慶軍節度推官監國子監書庫向 寇

承務郎 監 國 子 監 書 庫 曾 緑

延安府臨真縣令監國子監書庫鄧 平

潁州萬壽縣令監國子監書庫郭 翠

宣義郎 國 子 監 主 藥 王 仲懿

通直郎 國 子 監丞 武騎 尉 檀 宏

朝散郎守國子監司業上輕車都尉賜緋魚袋趙 捷之

朝奉郎守國子司業兼侍講雲騎尉龔 原

治平三年三月十九日

進呈奉

聖旨鏤板施行

朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書騎都尉賜解魚袋臣高保衡

朝奉郎守尚書都官員外郎同校正醫書騎都尉臣孫尚

朝奉郎守尚書司封郎中充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋袋臣林億

龍圖閣直學士朝散大夫守尚書三郎侍郎兼侍講知審刑院事兼判荷袋從舉禮泉觀典提舉樞密院上柱國彭城縣開國公食邑三千二百戶食實封三百戶賜紫金魚袋臣錢象先

中書主事卷之二

金匱要略誠醫家之要書也然學者漫不之顧以有箇之者全得祝先生均實所藏古本老眼雖昏勉強錄之洪武二十八年歲次乙亥秋八月三日甲子屬至二十五日丙寅歲時年七十三歲遷景長識

金匱要略言而入中書主事卷之二

卷之一
洪武二十八年歲次乙亥八月三日甲子屬



九月十一日帙

