

丹方全書

陽丹方大全

上海新華書局出版

附錄



中華民國九年六月一日出版
中華民國十年二月十日八版

呂純陽丹方大全（一冊）
定價大洋六角

版權所有

原著者 呂純陽

珍藏者 顧定安

校正者 沈思孚
黃元培

印刷者 新華書局

發行者 新華書局

總發行所上海
麥家圈仁濟醫院斜對面
新華書局

純陽丹方大全

醫藥一門。關係人之性命極重。嘗見窮鄉僻壤。驟患疾病之家。求醫不得。往往坐視病重而不救。間有覓得簡便之方。依然藥不對症。服之非惟無功。而且有害。本局心存濟世。惻焉憫之。爰請醫學大家。顧定安君。搜集極靈極驗之丹方一千種。分門別類。彙刻成書。推行各鄉各鎮。俾家貧無力之人。以及地僻無醫之處。不幸而患疾病。即可按症尋方。不致坐而待斃也。

陽^{呂純}丹方大全

無錫顧定安珍藏

甲編 全體病的丹方

治中風猝倒丹方 用竹瀝、薑汁、調蘇合香丸。如口噤、搥開灌之。如搥不開。急用牙皂、生半夏、細辛、爲末吹之。鼻內有嚏可治。無嚏則死。

治中風不語丹方 用泥捏成圈。圍住肚臍。令人撒尿在圈內。一時甦醒。然後用藥黃耆、防風、各數兩。水煎一大盆。放床上。使熱氣熏之時。時不斷。熏至一日卽語。其效如神。

(二)用烏龜尿。點少許於舌下。良久當語。

治中風口噤丹方 用荊芥穗爲末。酒服二錢。立愈。

治中風舌強丹方 用雄黃、荊芥穗等分爲末。豆淋酒服二錢。

治中風痰壅丹方 用旋覆花洗淨。焙研。煉蜜爲丸。桐子大。夜臥時。以茶下五九至七九十九。

丹方一千種

丹方一千種

11

治中風痰厥丹方 用白礬一兩。牙皂角五錢爲末。每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。

治中風氣厥丹方 用生附子、生南星各去皮。生木香五錢。每服四錢。薑九片。水二盞。煎七分。溫服。

治中風發熱丹方 用大戟、苦參四兩。白酢漿一斗。煮熟洗之。

治中風煩熱丹方 用醍醐四兩。每服半匙。溫酒和服。每日一次。

治中風腹痛丹方 用鹽半斤。熬水乾。着口中。飲熱湯二斤。得吐自愈。

治中風掣痛丹方 用乾艾揉團。結瓦甑中。並下塞諸孔。獨留一孔。以痛處著甑孔。燒艾熏之。一時即止。

治中風虛弱丹方 用羊肚一具。粳米兩合。和椒薑豉葱作羹食之。

治中風偏廢丹方 用草烏一斤。藁豆半升同煮。以豆熟爲度。去豆。將草烏刮去皮。切片。曬乾爲末。燒

酒對服。雖年老久病亦愈。

治口眼喎斜丹方 用活鱧魚一條。搗爛。左斜敷右。右斜敷左。嘴正。即將鱧魚血洗淨。免口又拉斜一

邊。屢試皆驗。

治角弓反張丹方 中風頭足往後扯動。彎曲不伸。其狀如弓者。用雞屎白三錢。酒五杯。以竹篴順攪。

一千遍飲之。日服二次。

治中風癱瘓丹方 猝然手足不舉。用穿山甲（泡熟）大川烏頭（泡熟）紅海蛤如棋子大者各二兩。爲末。每用半兩。搗葱白汁和成厚餅。徑一寸餘。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻汗出。急去藥。宜避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根。忌口遠色爲要。

治風溼癱瘓丹方 用臭梧桐二兩煎湯。以酒送下。連服十劑。其痛卽愈。再煎湯洗手足亦愈。

治風熱癱瘓丹方 用羌活、構子等分爲末。每酒服一匙。日三服。

治暑溼癱瘓丹方 用自然銅、燒紅酒浸一夜。川烏頭（炮）五靈脂、蒼朮各一兩。當歸二錢。共酒浸爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木卽止。

治風寒溼痛丹方 用老薑一塊。切去一面。將廣東馮了性藥酒炒透取出。另用馮了性藥酒燉熟。以薑蘸酒於痛處避風擦之。極效。

（二）用樟樹皮切細。加老薑搥融。和糯米酒糟炒熟貼之。冷則再換。日夜不斷。三日全愈。

丹方一千種

四

治歷節風痛丹方 由下而上。逐節疼痛。先自兩踝骨痛起。次日流上於膝。三日流於兩股。上至於肩

肩流於肘。肘流於後灣。每至一骨節疼痛難熬。諸藥不效者。用真紅川椒。去子及閉口者。以草紙兩層隔住。炒出汗。放地上。用瓦鉢蓋住。四圍用熱炭遮住。約一時久。取出研末。酒和米糕爲丸。梧子大。每服四十九。空心鹽湯送下。服至一觔自愈。

治白虎風痛丹方 用炭灰五觔。蚯蚓糞一觔。紅花三錢。和醋炒熱。布包作兩起。輪流熨之。甚效。

治骨軟風痛丹方 周身筋骨疼痛軟弱。經年不愈者。久服冬瓜有效。

治鬼箭風痛丹方 頭項肩背手足腰肢等處。筋骨疼痛不安者。用延胡索。肉桂。五靈脂。當歸。白芷。防風。各一錢。水煎服。另加木香一錢。水磨兌服。極效。

治痴頑癩狂丹方 用青橄欖一斤。打破。砂鍋內熬十數滾。去核。入石臼內搗爛。再熬。熬至無味。去渣。熬成膏。用白礬八錢。研末加入。攪勻。每日早晚取膏三錢。開水送下。服完自愈。

治羊癲風狂丹方 用青草或菜葉。放口中立時蘇醒。照前痴頑癩狂方法服之。可以斷根。

治風痰癰疾丹方 用天南星。九蒸。九晒爲末。薑汁。麪糊丸。梧子大。每服二十九。人參湯。或石菖蒲。麥

門冬煎湯送下甚效。

治失心風癲丹方 用甘遂二錢爲末。以猪心取三管血和藥入猪心內。縛定紙裏煨熟取末。入辰砂末一錢。分作四丸。每服一丸。將心煎湯調下。大便下惡物爲効。不下再服。

治偏身疼痛丹方 用延胡索、常歸、肉桂等分爲末。溫酒調服四錢立愈。

治尋常腰痛丹方 用絲瓜根、燒灰存性。每服二錢。酒下。雖痛不可忍者。可以立止。

治腎虛腰痛丹方 用羊腰一對。去白筋切片。以鹽醃去腥水。入杜仲三錢蒸服。酒下。或用荷葉包火中煨食亦可。

(二)用青殺羊脊髓和蒜炒。食以酒送下甚效。

治脾溼腰痛丹方 用白朮二兩、薏仁一兩五錢。水三碗煎湯一碗。一氣飲之。一服病卽如失。多以二劑爲止。此方不治腎。而正所以治腎也。

治虛寒腰痛丹方 用糯米二升。炒熟袋盛。拴於痛處。另以八角茴香研酒服。

(二)用破故紙一兩。炒爲末。溫酒服三錢神妙。

丹方一千種

六

治閃挫腰痛丹方

用真礪砂研末。以燈心蘸點眼四角。淚出卽鬆。連點三次卽愈。

治通身水腫丹方

坐臥不得者。用薊藿根。去皮搗汁一合。和酒一合。煖服。當微微吐利而愈。

治通身浮腫丹方

用縮砂仁、蠟帖等分研末。老酒冲服。

治病後浮腫丹方

用蝦蟆五隻。或六隻。男用單數。女用雙數。去皮並去頭與腸雜。不去肝。先入碗內

蒸熟。再入瓦罐內。加水半小碗。煮融。加陳酒一杯。再煮。先食湯。後食蝦蟆。不用鹽醬。連服數次。必愈。

治兩脅作痛丹方

用白芥子（炒）五錢研末。白滾水下。無論痛在左右。年老虛弱。百藥不效者。三服

除根。

治胸脇氣逆丹方

用白茯苓一兩。人參五錢。每服三錢。煎服。每日三次。卽愈。

治胸膈閉結丹方

用生蚯蚓四條。洗淨。研如泥。入生薑汁、薄荷汁、各一茶杯。蜂蜜半酒盃。井水調服。

若病勢熱甚者。加真梅片一二分。服下。再揉心下片時。汗出卽愈。

治黃疸立愈丹方

用蒼耳子、薄荷、木通、綿茵陳、各三錢。以陳酒入各藥。煎汁一碗。另加砂仁末（炒）

三錢。冲服。如小便色赤如血者。加黃連一錢同煎。神效。

治穀疸立愈丹方 因食而得者。用龍胆、一兩。苦參、三兩。爲末。牛胆汁和。九梧子大。先食以麥飲服五丸。日三服。

治勞疸立愈丹方 因勞而得者。用龍胆、二兩。苦參、三兩。爲末。梔子仁、七枚。以豬胆汁和。九梧子大。先食以麥飲服五丸。每日三服。

治女疸立愈丹方 經水不調。房事觸犯所致者。用礬石（燒）消石（熬黃）等分爲末。以大麥粥汁和服一小匙。日三服。病從大小便出。

治酒疸立愈丹方 用青瓜萐。焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。臥時服。五更瀉出黃物。卽愈。

治黑疸立愈丹方 用土瓜根。搗汁。平旦溫服一小升。午刻黃水當從小便出。不出再服。

治身出黃汗丹方 此溼熱也。將轉黃疸症。用薏苡根。煎湯。頻服甚效。

治自汗不止丹方 用舊蒲扇。燒灰。和粉撲之。或用酒調服一錢。極效。

治睡中盜汗丹方 用麻黃根。椒目。等分爲末。一錢。無灰酒下。外以麻黃根。舊蒲扇。爲末。撲之。

治陰症傷寒丹方 男女慾事後。或外受風寒。或內食生冷等物。以致肚腹疼痛。男子腎囊內縮。婦人

丹方一千種

八

乳頭內縮。手足彎曲紫黑。甚則牙緊氣絕。急用磚燒紅。隔布數層。在肚腹上熨之。

(二)用白朮三兩。肉桂三錢。丁香。吳茱萸。各一錢。水煎服。神效。

治四時傷寒丹方 用水香薷末。熱酒調服一二錢。取汗即愈。

治傷寒無汗丹方 用葱湯煮米粥。入鹽鼓食之。取汗極驗。

治傷寒譫語丹方 用上大黃五兩。(剉)炒微赤爲末。用臘雪水煎成膏。每服半匙。冷水送下。

治傷寒發狂丹方 用灶心土煎水。日服三次。即愈。

治傷寒頭痛丹方 用連鬚葱白八兩。生薑二兩。水煎溫服。

治傷寒目翳丹方 用淡豆豉(燒)二七枚。研末吹之。

治傷寒咽痛丹方 用射干。豬脂。各四兩。合煎去渣。熬膏。每噙棗許。自愈。

治傷寒衄血丹方 此當汗不汗所致。出血紫黑不止。用滑石粉。飯丸。桐子大。每服十九。微嚼破。新水

嚥下立止。

治傷寒舌出丹方 用頂上梅花冰片。半分爲末。搽之。即收。

治傷寒煩渴丹方 用秦芩一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。

治傷寒動氣丹方 用防葵一兩。木香。黃芩。柴胡。各五錢。每服五錢。水一杯半。煎八分。溫服。

治傷寒發喘丹方 用紫蘇葉一把。水煎。稍稍飲之。其喘立止。

治傷寒乾嘔丹方 用製半夏末一錢。生薑湯下。

治傷寒呃噫丹方 用枳殼半兩。木香一錢。爲末。每次白開水下一錢。未止再服。

治傷寒厥逆丹方 用人參半兩。水一鍾。煎七分。調牛膽南星末二錢。熱服立甦。

治傷寒心悸丹方 用甘草二兩。水三升。煮一半。服七合。日一服。甚良。

治傷寒煩燥丹方 用乾薑一兩。生附子一枚。去皮。水煎。頓服。

治傷寒懊憹丹方 用梔子十四枚。水二盞。煮一盞。入淡豆豉五錢。同煮至七成。去滓。服。得吐止。後再

服。

治傷寒痞滿丹方 用大黃二兩。黃連一兩。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。分作二服。溫服。

治傷寒脇痛丹方 用芫花甘遂大戟等分爲末。以大棗十枚。水一碗半。煮取八分。去渣。身強者服一

丹方一千種

10

錢弱者五分。平旦服之。

治傷寒結胸丹方 用牽牛子末一錢。白糖湯調服。

治傷寒熱結丹方 用大蚯蚓八兩。去泥。以人溺煮汁飲。或生絞汁亦可。

治傷寒血結丹方 胸膈脹痛者。用海蛤、滑石、甘草各一兩。芒消五錢。爲末。每服二錢。鷄子清調下。則

小腸通血亦流行。胸膈自利矣。

治傷寒腹脹丹方 用桔梗、半夏、陳皮各三錢。薑五片。水二鍾。煎服。

治傷寒肢痛丹方 用羊屎糞汁漬之。瘡乃止。或和豬脂塗之。亦可。

治傷寒搖擗丹方 出汗不徹。手脚搖者。用海蛤、川烏頭各一兩。川山甲二兩。爲末。酒丸如彈子大。捏

扁置所患足心下。別擘葱白蓋藥。以帛纏足。於暖室中熱水浸脚至膝上。水冷再添。候遍身汗出爲

度。凡三日一作。以好爲度。

治傷寒赤班丹方 用豬胆汁、苦酒各三合。雞子一個。合煎三沸分服。汗出卽愈。

治傷寒發黃丹方 用生薑、火煨去皮。布包扭汁。蘸香油。點兩目大小眼角甚效。

(二)用山茵陳、山梔子各三分。秦艽、升麻各四錢。爲末。每用三錢。水四合。去滓。食後溫服。以好爲度。

治傷寒下痢丹方 用黃連二兩。熟艾如鴨子大一團。水三升。煮取一升。頓服立止。

治傷寒尿瀉丹方 用石燕搗末。葱白湯調服五分。小便脹通爲度。

治傷寒餘熱丹方 用柴胡四錢。甘草一錢。每用二錢。水一盞煎服。

治傷寒勞復丹方 身熱大小便赤如血色者。用胡黃連一兩。山梔子二兩。去殼入蜜半兩。拌和炒令

微焦爲末。用豬胆汁和丸。桐子大。每服十丸。用生薑二片。烏梅子一個。童便三合。浸半日。去滓。食後

暖小便。令溫吞之。臥時再服效。

治感冒風寒丹方 用淡豆豉三錢。葱白一握。泡湯服之。取汗卽愈。

治偶然中寒丹方 用黑豆一合。炒焦。以酒沖入熱飲。微醺蓋被睡之。汗出卽愈。

治體虛中寒丹方 用生附子一兩。去皮臍。乾薑(炮)一兩。每服三錢。水二鍾。煎一鍾溫服。

治瘧疾不止丹方 用生薑一片。柴胡八分。半夏五分。廣陳皮八分。前胡八分。枳殼五分。防風八分。白

芷五分。甘草五分。查肉五分。青皮八分。煎服。無論陰瘧陽瘧。重者二三劑卽愈。

丹方一千種

一一

治溫瘧不止丹方 用當歸一兩。水煎。日一服。頗佳。

治鬼瘧不止丹方 去來不定者。用胡獼頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。

治勞瘧不止丹方 用鼈甲。醋炙。研末。酒服。方寸七。隔夜一服。清早一服。臨時一服。無不止者。加雄

黃。少許更佳。

治牝瘧多寒丹方 用雲母。燒兩日夜。龍骨。蜀漆。燒去腥。等分爲末。未發時漿水服五分。

治牡瘧獨熱丹方 用穿山甲一兩。乾棗十個。同燒存性爲末。每服二錢。發日五更井華水服。

治間日瘧疾丹方 用旱蓮草。研碎。如黃豆大。以紫蘇葉裹之。男左女右。塞鼻孔內。半日卽出涕淚。

輕者立愈。重者漸次而愈。

治三日瘧疾丹方 用首烏五錢。蒼朮三錢。白朮貳錢。甘草一錢。知母五分。水四碗。煎碗半。鷄鳴時服立止。

治三陰瘧疾丹方 用青皮。陳皮。當歸。知母。各三錢。真烏梅五個。水二碗。煎八分。露一宿。臨發日炖熱

服。其效如神。

治久瘡不止丹方 用牛膝一大把。水四碗。煎二碗。未來時一服。來過時一服。卽愈。

(二)用常山酒煮曬乾。知母。貝母。草薺。各錢半。水煎五更熱服。奇效。

治久瘡極虛丹方 用人參五錢。生薑五錢。水二碗。煎一碗。露一宿。次日五更溫服。當日卽止。

治久瘡成痞丹方 胸脇高起者是。又名瘡母。用毛脚芹菜。大蒜。銀硃。同搗爛。塗患處。以油紙蓋上。紫

住半日。皮上疼痛。口中有蒜氣出。其塊自消。

治夏日中暑丹方 急用蒜頭二顆。研爛。取路上熱土。日曬熱處淨土。污泥不可用。攪新汲水。調勻。服

一碗。甚效。

(二)用豆葉搗汁飲。亦效。

治夏日中暈丹方 用井水和麥麴一大抄。服之。

治夏日畏冷丹方 用硫黃。消石。等分。研末。石器內炒成沙。再研細。糯米糊丸。梧子大。每服四十九。新

汲井水送下。

治霍亂吐瀉丹方 急用胡椒四十粒。開水送下。卽愈。忌米飲。

丹方一千種

一四

(一)用艾一把。水三升。煮一升。頓服之。

(二)用食鹽一撮。放刀口上。燒紅。以陰陽水。卽半滾水半冷水。一鍾沖服。便愈。

治乾霍亂症丹方 凡欲吐不吐。欲下不下。嘔惡不止者。用鹽一兩。生薑半兩。搗同炒。令色變。以水一碗煎。熱服。

(一)用丁香十四粒。爲末。以熱湯一盞調服。

(二)用薤葉煎一升。服三次。立愈。

活霍亂轉筋丹方 凡瀉利不止。轉筋入腹。欲死者。用生薑三兩。搗爛。入酒一升。煮三四沸。頓服。

(一)用吳茱萸(炒)二分。酒二盞。煎一盞。分二服。得下卽安。

治陰痧立愈丹方 腹痛而手足冷者。用山查、連翹、枳殼、延胡索各一錢。薄荷七分。藿香、香附各四分。冷服。

治陽痧立愈丹方 腹痛而手足暖者。用荊芥、防風各一錢。連翹、陳皮、青皮各八分。川芎三分。稍冷服。

治斑痧立愈丹方 頭眩眼花。惡心嘔吐。身有紫斑痧在肉內。急用刮放。遲則入裏生變。用花粉、丹皮。

薄荷、地骨皮、山梔、元參、細辛等分煎冷服。

治瀉痢立愈丹方 滿身脹痛。面色塵黑。身有黑斑。毒在臍腑。氣滯血凝。以致疼痛難忍。急用蘇木、延胡索、五靈脂、天仙子、藟子各一兩。三稜、莪朮、姜黃、陳皮、枳實、厚朴各七錢。烏藥五錢。香附四錢。沉香三錢。降香三錢。阿膠二錢。水法爲丸。如菉豆大。每服十五丸。砂仁湯稍冷下。

治絞腸痧症丹方 心腹絞腸大痛。先用刮痧法治之。後用細辛一兩。荊芥五錢。降香三錢。鬱金二錢。共爲細末。每服三匙。清茶稍冷服。

治噤口痧症丹方 默默不語。語亦無聲者。用刮痧法治之。再服烏藥、青皮、陳皮、山查、紫朴等分。溫服。

治羊毛痧症丹方 腹脹連背。心或腰膀如芒刺然。用燒酒螯頭泥。研細篩過。和燒酒作輥擦痛處。卽有細白毛粘團上。

治痧氣內攻丹方 用元胡索、萊菔子、白芥三稜、蓬蓬各一錢。青皮、烏藥、枳殼各八分。紅花七分。香附四分。水煎稍冷服。

治痧氣食積丹方 用青皮、烏藥、枳實、羅蔔子、蓬蓬、三稜、枳實各一錢。水煎服。

治痧氣乾結丹方

用桃仁、去皮尖、麻仁、大黃、枳實、青皮、細辛、厚朴等分。水法丸。燈心湯冷服。

治痧氣壅盛丹方

用青皮、陳皮、山查、紫朴、蓬蘽、三稜、枳實、細辛、羅麻子、蓮翹等分。水煎稍冷服。

治四時瘟疫丹方

用松毛、切碎、（搗）每用二錢。酒冲服。日三服。極妥極效。

（二）用麻黃、乾薑、明天麻、藁豆、研細、松蘿茶、各一兩二錢。生甘草、明壳硃砂、明雄黃、各八錢。生大黃、二兩。共爲細末。蜜丸彈子大。大人一丸。小兒半丸。涼水調服。出汗卽愈。

治蝦蟆瘟瘡丹方

時行面赤項腫者。用青蛙、搗汁。水調。空心頓服。甚效。

治大頭瘟瘡丹方

頭面腫大。咽喉閉塞者。用延胡索、錢半、皂角、川芎、各一錢。藜蘆、五分。躑躅花、二分。

半。共爲細末。用紙撚蘸藥。入鼻中取嚏。日三五次。甚效。嚏出膿血者。更妙。無嚏難治。左右看護之人。用此取嚏。亦不傳染。

（二）用福建鹼花、三錢。雞子清、一個。燒酒、一盃。調服。神效。

（三）用吳茱萸、研末。醋調敷足心。一週時取下。卽消。如未退。再敷一週時。必效。

治鼠疫傳染丹方 鼠類爲本病之原。故平日以驅逐鼠類爲預防之要着。若犯此症。用生石膏、一兩。

至八兩。元參、四錢至一兩。野菊花、四錢至一兩。金銀花、四錢至一兩。連翹、四錢。甘草、一錢。薄荷、二錢。丹皮、四錢。射干、二錢。川貝母、二錢。右藥十味。清水煎服。不拘劑數。全愈爲止。

治肺炎疫氣丹方 初起發熱欬嗽吐血。病不過三日卽斃。一時傳染相同者是。病起兩晝時內急用。

西牛黃(吞)一分。鮮薑蒲(打)三錢。當門子(吞)二厘。老梅片(吞)一分。生大黃、五錢。芒消(後下)五錢。千金霜、一錢。山慈菇、一錢。犀角尖(磨冲)一錢。生石膏、五錢。甘中黃、三錢。車前子、三錢。木通、二錢。萊菔汁(冲)八兩。

治山嵐瘴氣丹方 用羚羊角末。水服一錢卽解。

(二)用當門子、三分。水服卽解。

乙編 頭部病的丹方

治偏正頭風丹方 用大烏頭(去皮)四兩。南星(泡)一兩。共爲末。每服二錢。薄荷七分。鹽梅一個。煎水臨睡調服。

(二)用白芷、三錢。天麻、防風、各一錢。荆芥、一錢五分。共研末。煎服。

丹方一千種

一八

(三)用鮮鵝兒不食草。塞鼻。甚妙。

治雷風頭痛丹方 用山羊糞。炒枯。每服二錢。酒送下。百藥不效者。服此卽愈。

(二)用天麻。升麻。各一錢。新荷葉一大張。煎服。

治風寒頭痛丹方 用大附子二枚。去皮蒸過。川芎。生薑。各一兩。焙研。以茶湯調服。一錢。

治風熱頭痛丹方 用荊芥穗。石膏。等分爲末。每服二錢。茶調下。

治熱痰頭痛丹方 用懸栝樓一個。王瓜七個。(焙)牛旁子(焙)四兩。爲末。每食後茶酒服三錢。

治氣虛頭痛丹方 用真川芎。爲末。臘茶調服二錢。甚捷。

治氣鬱頭痛丹方 用香附子(炒)四兩。川芎二兩。爲末。每服二錢。臘茶清調下。常服除根。

治酒後頭痛丹方 用竹茹二兩。水煎。納雞子三枚。煮三沸。含之。

治頭腦鳴響丹方 用春茶子。爲末。吹入鼻中。甚效。

(二)用土茯苓。煮豬肉。食之。神效。前後忌茶十天。

治頭腦暈眩丹方 用白果二個。去殼。生搗爛。沖滾水。空心服。至重五服卽安。

治腦漏臭水丹方 用草烏頭、去皮半兩。蒼朮一兩。川芎二兩。並生研末。麪糊丸綠豆大。每服十九茶

下。

治腦後作痛丹方 用熟地五錢。真山藥炒雲苓當歸各三錢。炒白芍二錢。川芎陳皮炙甘草各一錢。

天麻錢半。麻黃三分。水煎服。

治頭面紅癰丹方 用大黃遠志等分爲末。豬胆汁調搽。極效。

(二)用紫薇花半茶盃。煮精豬肉食之。可保一年不生。

(三)初起者。用苦蕒菜根折斷。有白汁出。取汁搽之。卽消。

治頭上軟癰丹方 用野芋頭磨醋敷。舊船底陳石灰研末。油調敷。

(二)用豬頭上毛。貓頭上毛。各一撮。燒灰。雄鼠糞兩頭尖者一粒。共研末。香油調敷。雖數年不愈。亦效。

治面上雀斑丹方 用豬牙皂角。紫背浮萍。青梅。櫻桃。各一兩。鷹屎白。或鴿屎白。三錢。共研細末。每晚

用少許。在手心內水調濃。擦面上。良久。以溫水洗面。至七八日後。其斑皆去。神效。

(二)用紫背浮萍。漢防已。煎水洗。或晒乾爲末。搽之甚效。

治面上粉刺丹方 用菟絲苗絞汁塗之。不過三次。即愈。

(二)用溝渠小萍爲末。日敷之。

治面上酒刺丹方 用輕粉、黃芩、白芷、白附子、防風各一錢。爲末。蜜丸。每日洗面時。多擦數次。臨睡時。又重洗面而擦之。三日消痕滅跡。

(二)用紫參、丹參、黨參、苦參、沙參各一錢。爲末。胡桃肉搗融爲丸。桐子大。每服三十九。茶送下。

治面上黑氣丹方 用白殭蠶爲末。和水搽之。

(二)用天門冬和蜜糖內搗爛。每日洗面即退。

治面上皺紋丹方 用大母豬蹄四個。洗淨。煮成膏。臥時搽面上。次早洗去。半月後。即不皺矣。

治面上癰痕丹方 用白蒺藜、山梔各一兩。爲末。醋調。夜塗旦洗。疤痕漸脫。甚效。

治千層面瘡丹方 俟破口時。用新鮮橄欖核燒灰。和雞子油。以鴨毛調敷。

治面上生瘡丹方 急尋有壳蝸牛一二條。搗融。攤紙上貼之。即愈。紙上留一小孔出氣。初起用之神效。

(二)用鹿角、燒研、豬胆、調搽亦效。

治兩耳聾閉丹方 用甘草、生地、研極細末、胭脂包、三分、日間塞耳、再用甘遂、草烏、研極細末、棉花三分、晚間塞耳、其效。

(二)用北細辛末、一錢、將黃蠟、溶化爲丸、如鼠糞大、以棉裹塞耳、一二次、即愈。

治腎虛耳聾丹方 用殺羊脊骨、一具、炙研、磁石、煨醋淬七次、白朮、黃芪、乾薑(炮)、白茯苓、各一兩、肉桂、三分、爲末、每服五錢、水煎服。

治病後耳聾丹方 用菖蒲、搗汁滴之、神效。

治耳內惡瘡丹方 用雞矢白、炒研、傅之。

(二)用蚯蚓糞、爲末、吹入、以麻油調搽。

治耳外濕瘡丹方 用雞腰、一對、蒸熟去皮、枯礬、三分、共搗融、加頂上冰片、二分、敷之、其效如神。

治耳中有核丹方 用火酒、滴入、仰頭片刻、即可箝出。

治耳鳴不止丹方 用生烏頭、一個、乘濕削如棗核大、塞於耳內、日換數次、過三五日便愈。

丹方一千種

一一一

治耳癢難忍丹方 治法同耳鳴。

治耳中叮嚀丹方 用白頸蚯蚓入葱葉中化爲水。滴入令滿。示過數次有驗。

治耳流膿血丹方 用石榴花片瓦上焙枯研末。加冰片少許吹入。三四次卽愈。

(二)用龍骨研末吹入亦可。

治耳中出血丹方 用蒲黃炒黑研末摻入。

治耳後月蝕丹方 用旋覆花燒研。羊脂和塗之。

治耳中生痔丹方 用輕粉、雄黃、各三錢。礞砂一錢。冰片五厘。研細末。水調濃厚。以谷草梗咬毛蘸點。

患處並用牛旁子、柴胡、川芎、梔子、熟石膏、當歸、甘草、酒芍、丹皮、各二錢。黃連、黃芩、各五分。水煎食後

服自愈。

治耳中生葷丹方 治法同耳中生痔。

治耳中生疔丹方 用鮮紅菱柄炙灰。加礞砂、梅片少許。研細末吹入。

治凍耳成瘡丹方 用生薑搗汁熬膏。敷耳神效。

治耳被挖傷丹方 用金頭蜈蚣一條。瓦上焙存性。研末吹入。立效。

(二)用青魚胆一個。紅花一錢。元參、生地各二錢。蒸出濃汁。灌入即愈。

治水銀入耳丹方 用真金首飾枕耳即出。

治流水入耳丹方 用鮮薄荷搗汁。滴入耳內。立效。

治壁虎入耳丹方 用雞冠血。滴入自出。

治蜈蚣入耳丹方 用生薑汁。或韭菜汁。滴入即出。

(二)用炙豬肪掩耳自出。

治螞蝗入耳丹方 用田中泥土。放於耳邊。自出。

治蛭蚰入耳丹方 用生半夏末。蘇油調塗耳門。聞香即出。

(二)用雞冠血和香油滴入即出。

(三)用羊乳滴入。立化爲水。即愈。

治蛆虫入耳丹方 用綠礬末。摻入。即化爲水。

丹方一千種

二四

治飛蛾入耳丹方 宜端坐。點燈光向耳竅。其虫見光自出。

治螞蟻入耳丹方 用穿山甲燒研細末。水調灌入耳內。卽出。

治蚤虱入耳丹方 用石菖蒲炒熱。袋盛枕之效。

治臭虫入耳丹方 用蘇油數滴。滴入耳中。虫則死矣。

治蠅蚊入耳丹方 用皂莢中蟲研爛。同鱸魚血灌入。甚效。

治諸虫入耳丹方 用手緊閉耳鼻。閉口不言。虫入之耳不閉。少頃自出。或用好醋、麻油、韭汁、葱汁、姜汁。此數種隨便滴入耳中自出。

治兩目紅赤丹方 用野菊花、桑葉煎水。俯首盆口。上覆布襖。使熱氣入目。俟稍溫。將水洗之。甚效。

(二) 用黃連三分。人乳半盃。同攪和。臨睡時點之。

治風熱目赤丹方 用地膚子(焙)一升。生地黃半斤。取汁和作餅。晒乾研末。每服三錢。空心酒下。

(二) 用蚯蚓十條。炙爲末。茶服三錢。

治肝熱目赤丹方 用豬肝一具。切薄片。水洗淨。以五味食之。

治肝虛目赤丹方 用青羊肝薄切。水浸吞之。極效。

治肝熱目痛丹方 用夏枯草（炒）二兩。香附（醋炒）二兩。甘草（炒）四錢。共爲末。每服錢半。清茶送下。數日卽愈。

（二）用龍胆草一味。瓦器內熬成膏。點入眼內。甚效。

治腎虛目赤丹方 用甘州枸杞。上好新紅者一斤。用好酒浸一夜。拌炒四起。一起以川椒二兩拌（微炒）一起以小茴香拌炒。一起以黑芝麻拌炒。以上三起。均去拌者不用。再以淨鹽二兩研末拌炒。鹽卽入藥。另用當歸頭、生地、白菊花、白朮、白茯苓各四兩。共爲末。每於午飯後。開水服三四錢。久則目如童子。

治晨起目赤丹方 用生地汁煮粥。日食一盞。數日卽愈。

治病愈目赤丹方 用蒸大豆作枕。以青布灸熱。時時熨之。

治眼中起星丹方 用白鹽少許。燈心蘸點三五次。不痛不礙。屢試有效。

（二）用葶藶取汁。成粉去渣。取粉點之。甚效。

丹方一千種

二六

治眼生白翳丹方 用鵝兒不食草。採取陰乾。晒燥研末。搐鼻塞耳。去翳神效。

治眼生赤翳丹方 用雄雀屎。和人乳。點之。自去。

(二)用白羊爛敷之。有效。

治眼生花翳丹方 用刀刮指甲。細末。和乳。點之。自消。

治內外翳障丹方 用夜明砂末。化入豬肝內。煮食飲汁。效。

治眯目生翳丹方 用炮薑。瞿麥。同爲末。井水調服二錢。日二服。卽愈。

治羞明怕日丹方 用黃甘菊。生甘草。石決明。各一錢。水煎。冷服。

治目難遠視丹方 用羊肝一具。去膜。細切。以葱子一勾。炒爲末。以煮熟去滓。入米煮粥食。

治目昏多淚丹方 用生地。熟地。川椒。去子。閉口者不用。各等分爲末。蜜丸。梧子大。每服五十九。鹽米

湯空心下。二月後自愈。

(二)用鮑魚胆七個。人乳一錢。和勻。飯上蒸一二次。點眼。其淚自收。

治瞳人反背丹方 用蜜蒙花。蟬蛻。白菊。郁李仁。石膏。草決明。石決明。甘草。谷精草。白礬。各四錢。百部。

二錢珍珠四分。另爲末。以上共爲末。分量不可加減。和瘦猪肉二兩。搗爛煮服。卽時發時發熱者。其光必轉。若光未盡轉。再服一劑。愈。再用石膏、蟬蛻、梔子、槐花、白菊花各一錢。生地、蒙花各二錢。草決明一錢半。甘草五分。煎服一二劑。

治目生赤脉丹方 用生甘草二錢半。元精石五錢。爲末。每服一錢。竹葉煎湯調服。有效。

治火眼赤爛丹方 用紅棗五個。入綠礬在內。火煨熟。以河水、井水各一盞。桃柳心各七個。煎稠。每點少許入背上。

治風眼赤爛丹方 用青礬火煨出毒。細研泡湯。澄清點洗。卽愈。

(二)用青鹽化水點之。亦效。

(三)用牙消一盞。水二盞。煎化露一夜。濾淨澄清。朝夕洗目。三日其紅卽退。

治風眼下淚丹方 用黃連浸濃汁。漬拭之。

治眼中膿水丹方 用龍胆草、當歸各一錢。爲末。溫酒下。

治眼生珠管丹方 用牛膝并葉搗汁。日點三四次。甚效。

丹方一千種

二八

治眼生息肉丹方 用鹽脂肪、白鹽等分。和勻注兩目眚頭。目三次。一月卽瘥。

治眼生偷針丹方 用白芨磨水點之。卽效。

(二)用瘦豬肉一薄片。黏於眼皮上。隔一夜卽愈。

治眼癢難忍丹方 用礪活、枯礪、礪砂共研細末。入口無渣爲度。以口水調如米大。用時將一丸納入目中。少頃。棗湯洗下。

治眼弦生蟲丹方 用覆盆子葉爲末一錢。乾姜(燒灰)生礬各五厘。枯礪一分。共研細。蜜調用綢片做膏藥貼眼上一夜揭起。虫自黏在綢上。次晚又用豬肉一薄片貼眼上一夜卽愈。

治眼皮生瘤丹方 用櫻桃核磨水擦之。漸消。

治雙目雞盲丹方 用羊肝二兩。煮熟點鍋底烟。食二三次卽愈。鍋底烟以燒稻草者佳。燒煤炭者斷不可用。

治青光瞎眼丹方 用白羊肝一具。竹刀切片。黃連一兩。研末。熟地黃二兩。同搗爲丸。桐子大。每服七十丸。日三服。有效。

治拳毛倒睫丹方 用木燐子一個。去殼爲末。綿裹塞鼻中。左眼塞右。右眼塞左。一二夜卽愈。

(二)用五倍子爲末。蜜調敷眼皮上。其睫自起。

治眼珠暴出丹方 用威靈仙。淫羊霍。各一錢。水煎服。

治眼珠縮入丹方 用老姜。燒熱。貼於眉心。卽愈。

治蟾酥入目丹方 用紫草。搗汁點之。卽愈。

治泥沙入目丹方 用頂粗牛膝一條。約二寸長。本人嚼爛如泥。吐出搓入。塞於二眼角。其淚流必多。

少刻泥沙裹藥盡出。其目遂愈。

治塵芒入目丹方 用生藕汁。滴入。自出。

治飛絲入目丹方 用蔓菁。搗汁。滴二三點入目。其絲自出。

治蛛絲入目丹方 用明礬。化入滾水中。貯於盆內。將首俯於盆上。頭上罩以布袱。以熱氣薰之。其絲

自落。

治麥芒入目丹方 用大麥。煮汁洗之。卽出。

治竹木入目丹方 用蚯蚓、搯斷、滴血入眼、卽出。

治石灰入目丹方 用洋蜜、將眼皮展開、滴入無害。

治碱水入目丹方 用鮮牛奶、點洗、有效。

治硫酸入目丹方 急用清水屢屢洗之、或先用炭酸曹達水、洗之、可減其毒。

治雜物入目丹方 用左手指甲、以刀刮細末、燈草蘸點一二次、甚效、如不能出、卽用好墨、磨濃點之。

亦效。

治鼻血不止丹方 用鵝兒不食草、嫩頭、陰乾、研細末、薄漿爲丸、桐子大、黑山梔、極細末、塞鼻立止。

治鼻塞不通丹方 用小薊、一把、水二升、煮取一升、分服。

治鼻中生痔丹方 用甜瓜蒂、四錢、甘遂、一錢、枯礬、螺壳灰、草烏灰、各五錢、爲末、麻油調作丸、如鼻孔

大、每日以藥塞入一次、其痔化爲水、肉皆爛下、卽愈。

(二)用輕粉、二錢、杏仁、七粒、去油、白礬、五錢、共爲末、吹入鼻中、卽化爲水。

治鼻孔爛穿丹方 用鹿角、(剉碎焙)枯礬、各一兩、頭髮、五錢、燈心、燒灰、共研爲末、先用花椒水、洗淨。

敷藥甚效

(一)用五倍子、燒灰存性研末。以黃蠟與豬油和勻敷之。

治鼻準紅赤丹方 用鹽研細。每朝擦牙。噙水漱口。吐入手中洗面。月餘自愈。

(二)用白果、嚼融和甜酒糟。夜敷日洗。甚效。

治鼻中生瘡丹方 用苡米、東瓜、煎湯當茶飲。神效無比。

(二)用杏仁、去皮尖。搗爛成膏。用人乳調塞鼻內。

(三)用嫩桃葉、搗爛塞鼻。無葉用枝亦可。

治生生瘰癧肉丹方 用真礪砂點之。即落。

(二)用頂上梅花冰片點之。即愈。

治鼻流清涕丹方 用生花生四、五斤。入鍋內。令本人親手拌炒。炒之數次。即愈。神效。

治鼻中毛出丹方 用乳石、礪砂等分爲丸。臨臥服十九。自落矣。

治食物入鼻丹方 用牛脂一棗大。納鼻中吸入。脂消則物隨出矣。

丹方一千種

三

治口臭難聞丹方 用益智仁一兩。甘草二錢。共爲末。每用一二錢。乾吞下。

(二)用鹽梅。時時食之。

(三)用白牽牛粉。擦牙漱口。日久自無此病。

治夜臥口渴丹方 用元參一二片。含於口中。卽生津液。

治口中糜爛丹方 用薔薇根。避風打去土。煮濃汁。溫含冷吐。冬用根皮。夏用枝葉。皆效。

治口角生瘡丹方 用經年葵根。燒灰敷之。

(二)用殺羊鬚。荆芥。乾棗肉。各二錢。燒存性。入輕粉半錢。每洗拭清油。搽二三次。必愈。

治兩腮赤腫丹方 用皂角二兩。生南星二錢。糯米一合。共爲末。生姜汁調敷。立效。

(二)用大黃。白芨。五倍子。共爲末。雞蛋清調搽。

治腮漏不止丹方 用荆芥。防風。羌活。獨活。柴胡。前胡。川芎。枳殼。桔梗。茯苓。各一錢。甘草五錢。薄荷三

分。水煎。外用夜合花樹皮。煎水洗。並用夜合花樹皮。搗融敷。再用夜合花根。煎濃湯。時含口內。有人

患此十年不愈。照此除之。收口斷根。

治上脰生癰丹方 急用食鹽燒紅。枯礬各等分。研細末。以篋頭蘸點。日三五次自愈。

治下頰脫落丹方 宜平身正坐。令人以兩手托住下頰。向腦後送上關竅。隨用布紮住。避風。外敷天南星。研末。姜汁調塗兩頰。一夜卽上。

治頸項直硬丹方 用宣木瓜二個。取蓋去瓢。乳香二錢半。沒藥二兩。同入瓜內。加蓋縛定。飯上蒸三四次。搗爛如泥。每用三錢。入生地汁一盞。好熱酒二盞。化開溫服。

治牙齒疼痛丹方 用烏梅燒存性。研末。加頂上梅花冰片少許。擦之神效。

(一)用樟腦膏貼於兩頰。俟兩頰浮腫。則毒發洩。痛自可減。他若其齒朽腐不堪。不妨拔去。治風火牙痛丹方 用鮮生地搗爛。加潮腦少許。不可過多。捶勻貼患處。吐出涎水神效。

(二)用五倍子末。冷水調敷腮頰。甚效。

(三)用莧菜根。燒灰敷之。極效。

治陰虛牙痛丹方 用牛膝。去心鹽水炒五錢。豬腰一對。一豬身上所生者。煮粥食立效。

(二)用陳梅子。含口內。吐出涎水。數次神效。

丹方一千種

三四

(三)用胡桃壳四五斤。打至粉碎。加川椒、食鹽少許。熬濃汁。攤冷時時漱齒極效。

治腎虛牙痛丹方 用硫黃、甘松香等分爲末。泡湯漱之。

治溼熱牙痛丹方 用梧桐淚。嵌於痛處。吐出涎水。數換卽愈。

治風寒牙痛丹方 用高良薑三寸。全蠍一枚。焙爲末。搽之。吐出涎水。鹽湯漱口。

治虫蛀牙痛丹方 用明雄末二兩。真小磨麻油四兩。調勻。含口漱。片時吐出。漱數次卽愈。

(二)五倍子煎濃汁。含漱數次。其虫立死。其患永除。

治打動牙痛丹方 用白蒺藜根。或子搗末。日日揩之。

治牙齦生癰丹方 用生白礬六錢。枯白礬三錢。明雄黃一錢。共研極細。篩過。搽綿紙上。捲成紙捻。塞

牙根邊。久塞可保不脫。日換數次卽愈。

治骨槽風痛丹方 用桔梗爲末。棗瓢和丸。皂子大。綿裹咬之。以荊芥煎湯漱之。

治走馬牙疳丹方 用紅棗一枚。去核。入紅砒一粒。如黃豆大。紮好。放瓦上。炭火炙至棗枯。烟盡爲度。

取出。用碗蓋住。候冷。加頂上梅花冰片一分。研末。將患處洗淨。吹入。效速如神。

(一)用桐油少許敷患處。三五次即效。若入口覺有桐油氣。即非是症。宜止之。

治牙縫出血丹方 用黃豆渣敷之。內服九製熟地、真山藥、真雲苓、丹皮、澤瀉等分。水煎服。神效。

(二)用馬糞燒灰存性。搽之立愈。

治牙縫出膿丹方 治法同虫蛀牙痛。

治齒腐齲爛丹方 用上齒齲熱水淋汁。以石器熬乾。刮下入當門子少許。研勻搽之。

治齒齲黑臭丹方 用苦參煎湯漱口。數日有效。

治齒齲宣露丹方 用鹽湯每晨含漱多次。數日後齒即堅牢。

治齒疎陷物丹方 用寒水石、爐甘石煨等分爲末。每日用少許擦牙。無用牙刷。以指代之。久則堅密。

治牙齒作酸丹方 用胡桃肉食之。即愈。

治睡中磨齒丹方 用所睡蓆下灰塵一捻。納入口中。勿令本人知之。即愈。

治食梅齒齲丹方 治法同牙齒作酸。

治食榴損齒丹方 用石榴皮燒存性爲末。搽之。

丹方一千種

三六

治唇上生菌丹方 嘴唇翻突。狀如猪嘴。過一週時。無藥可救。急用燈火以燈心一莖。點清油燒之。在少商穴燒一下。然後用活蚯蚓十條。搗爛。吳茱萸二錢。研末。加灰麪少許。熱醋調敷兩足心。又用布捆住。半日一換。以愈爲止。

治唇破生瘡丹方 用瓦松、生姜汁搗融。入鹽少許敷之。

治唇邊生瘡丹方 用旋覆花放瓦上煨存性。研以真蘇油調擦。卽愈。

法缺唇收口丹方 用麻藥敷上。然後將刀割開兩邊薄皮。再用絲線縫好。以生蟹黃敷之。靜坐七日。勿言勿笑。自能收口。

治人中腫大丹方 用川連、頂上梅花冰片各一錢。生蒲黃二錢。共爲細末。麻油調敷。

治口唇緊小丹方 此症初起。不能飲食。若不急治。難效。一名繭唇。急用五倍子、蜜陀僧各二錢。甘草二分。共爲末。另用黃柏二錢。將各藥水調敷黃柏上。在火上烘乾。再敷再烘。藥盡爲度。然後將黃柏

冷透。作薄片貼上。連換數次。過夜卽愈。

治唇乾血出丹方 用桃仁搗爛。猪油調敷。

治唇皮破裂丹方 用煉熟豬油。日日塗之。

治舌頭潰爛丹方 用吳萸三四錢。研末。熱醋調敷兩脚心。用布紮好。一週時一換。極效。

治舌脹滿口丹方 急用皂礬不拘多少。放新瓦上煨紅。攤冷研細。以調羹搗開牙關。將藥擦舌上。再

用鍋底烟三錢。以燒稻草者佳。燒煤炭者忌用。酒冲送服。神效。

治舌忽縮入丹方 用銀針刺破舌尖。惡血出盡後。以燭油擦之。立愈。

治舌生重舌丹方 用巴豆半粒。飯四五粒。共搗爛爲餅。如黃豆大。貼在印堂中。待四圍起泡。去之即愈。

(一)用黃柏和竹瀝。泡一夜。取汁點之。

治舌硬如木丹方 用草薢子搗爛。以紙取油。將紙搓條。點火吹滅。以烟向舌薰之。即消。

(二)用蒲黃研末。時敷舌上。其腫自消。

(三)用殭蠶爲末。吹入吐痰甚效。

治舌捲口角丹方 用明雄研末。點舌數次。即安。

丹方一千種

三八

(一)用川連一分。蒸水服卽愈。

治吐舌不上丹方 用人中白、冰片、和勻。鵝毛刷上。再用上川連二分煎服。舌自收入。

(二)用冰片、雄黃、硼砂、共爲末。乳調塗舌上亦效。

治舌上生菌丹方 此惡症也。初起如豆。漸大如曹者。用礞砂、人中白、各五分。瓦上青苔、瓦松、溲雞糞、

各一錢。用傾銀罐子二個。將藥裝入封固。外用鹽泥封好。以炭火煨紅。待三炷香爲度。候冷開罐取出。入頂上冰片、麝香、各一分。共研細。用時先以磁針刺破血菌。用藥少許點之。再以清黃末蓋之。內

服姜製半夏二錢。陳皮、白茯苓、各一錢。甘草五分。黃連、薄荷、各三分。黃芩一錢。加薑煎服。

治舌上出血丹方 用六味地黃丸一兩。加槐花三錢。煎服立愈。

(二)用槐花炒研摻之。卽止。

治小舌落下丹方 用鹽極攪。連核燒灰存性。研末吹之。卽上。

(二)用食鹽炒熱點之。甚效。

治風火喉痛丹方 用薄荷一錢。連翹、射干、牛旁、馬勃、各二錢。生棗豆皮三錢。水煎服。

(二)用單甯酸一錢。溶水四五合。含漱。

治肺熱喉痛丹方 用桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升。分服。

治發斑喉痛丹方 用甘草。升麻。元參。各五錢。水三杯。煎杯半服。

治老癆喉痛丹方 用炒麥冬。生甘草。各三錢。糯稻根。洗淨五錢。甜白沙參。石斛。各一錢半。生雞蛋一個。去黃留白。水煎服。

治單雙喉蛾丹方 用鮮牛膝根一握。搗汁和陳酢。灌之。

(二)用蟾酥和草烏尖末。豬牙皂角末。等分爲丸。小豆大。每研一九。點患處神效。

(三)用手指甲。燒灰吹之。其蛾立破。至便至神。

治喉痺立愈丹方 用皂角。研末。醋調服一錢。重則錢半。或用鵝毛蘸藥入喉。攪動亦可。並敷喉外。乾則隨換。少頃吐出痰涎。即愈。

治喉痺口噤丹方 用蚯蚓一條。研爛。以雞蛋清調和。灌入。即通。

(二)用馬蘭根葉。搗汁入米醋。少許。滴鼻孔。或灌喉中。取痰自開。

丹方一千種

四〇

治風熱喉痺丹方 用白殭蠶一錢。月石半兩。牙消兩半。冰片一分。爲末吹之。

治走馬喉痺丹方 用膽礬二錢半。白殭蠶(炒)半兩。爲細末。用少許吹之。

治瘰癧喉痺丹方 用生商陸根。搗作餅。置瘰癧上。以艾絨炷於上。炙三四度。甚效。

治冬月喉痺丹方 用生石膏一兩。月石七錢。冰片三分。白殭蠶一錢。爲細末吹之。

治內外喉風丹方 用雄黃(飛)鬱金各一兩。巴霜十四枚。爲末。醋糊丸綠豆大。熱茶送下七丸。吐出頑涎。卽甦。吐出再服大效。如口噤。以物撬開灌之。下咽得活。

治白點喉風丹方 用大生地一兩。麥冬(去心)六錢。白芍(炒)四錢。薄荷二錢半。元參八錢。丹皮四錢。母貝(去心)四錢。生甘草二錢。如喉間腫甚者。加煨石膏四錢。大便燥結。數日不通者。加青甯丸二錢。元明粉二錢。胸下脹悶者。加神麴二錢。焦查二錢。小便短赤者。加木通一錢。知母二錢。澤瀉二錢。燥渴者。加天冬三錢。馬兜鈴三錢。面赤身熱舌苔黃者。加銀花四錢。連翹二錢。每日煎服三劑。卽愈。

治鎖喉風痛丹方 用白礬(燒枯)白殭蠶(炒)月石皂角炙烟盡各等分。爲細末。每用少許吹喉中。

痰出卽愈。

治喉間腫痛丹方 用防風、金銀花、荊芥、薄荷、桔梗、黃芩、黃連、各一錢半。山梔、連翹、元參、大黃、朴硝、牛

旁（炒）甘草、各七分。水二鍾。煎一鍾。食遠服。

（二）用甘草二錢。桔梗一錢。荊芥穗二錢。水二鍾。煎八分。食後服。

（三）用硼砂、白梅、等分。搗丸。芡實大。每嚙化一丸。

治咽喉閉塞丹方 用馬牙硝、研細末。每服一錢。綿裹含嚙。以通爲度。

（二）用白殭蠶、直者十個。硼砂、雄黃、全蝎、十個。全者去毒。明礬、牙皂、去皮、各一錢。胆礬、五分。共爲細末。每用一分。吹入喉中。卽愈。

治喉中生癰丹方 用白礬三錢。銅銚內溶化。入劈開巴豆三粒。煎乾去豆。研礬吹二三次立愈。甚者以醋調灌之。或用治咽喉閉塞方治之。

治喉中生瘡丹方 用黃柏爲末。用蜜丸炙數次。以熟爲度。另研爲極細末。以白硼砂、白殭蠶、各錢半。牛黃三分。冰片半分。用蜜調如稀糊。塗敷患處。或丸如龍眼大。含化嚙之。

丹方一千種

四二

治爛喉痧症丹方 用牛黃五厘。青黛六分。冰片二厘。象牙屑。焙黃三分。指甲五厘。焙黃男女互用。壁
蟾窩二十四枚。真珠三分。研細末吹之。

治風火喉癰丹方 用頭胎黃牛屎。放新瓦上。並用瓦蓋周圍。文武火煨至烟盡存性。連瓦取下。用鉢
蓋住候冷。研末吹入自愈。

(二)用射干二兩。洗淨搗爛取汁。甜酒送下。

治喉中生肉丹方 用臭橘葉煎服數次。即愈。

(二)胆礬。啣口內。惡涎吐盡。自愈。

治喉中結塊丹方 用百草霜和蜂蜜爲丸。如茨子大。新汲井水化一丸灌下。甚者不過二丸。即消。

治喉中作癢丹方 初起不可吃茶酒湯水。急用薄荷二分。當門子五厘。研細末吹入。吐出涎水碗許。
再用陳米湯飲之。自愈。

治咽喉聲啞丹方 用訶子四個。半生半煨。桔梗兩半。半生半炒。甘草二寸。半生半炙。共分二服。每服
水一鍾。童便一鍾。煎八分。食後溫服。

(二)用生白礬煉蜜爲丸服之。

(三)用豬油二斤熬去渣。入白蜜一斤再煉。少頃瀝淨入磁器內。俟成膏。不拘時挑服一匙。甚效。

治頭生禿瘡丹方 用松香末二兩入葱管內。用綫扎定。水煮融化。去葱研末。黃丹(水飛)一兩。無名

異(炒)一錢。宮粉(炒)一錢。輕粉(炒)三分。共爲細末。香油調搽效。

(二)用鴿糞研末敷之。先以醋泔淨洗效。

治髮枯不潤丹方 用桑白皮、柏葉各一斤。宣木瓜半斤。泡油搽頭卽潤。

治髮短而少丹方 用桑葉、麻葉以淘米水煮汁洗之。洗至七次。可長數寸。

治髮黃而赤丹方 用生柏葉一斤研末。豬油和爲丸。如彈子大。每日用一丸。淘米水放開洗之。一月

後色黑而潤。

治頭癢髮落丹方 用蘆薈、苦揀子各一錢。爲末。吹入鼻內。數次自愈。

治髮落不生丹方 用墨芝、藤梗、柳樹枝各等分。熬水洗頭。或泡油搽頭更妙。髮易生長。

(二)用旱蓮草搗敷。易生而多。

治髮易脫落丹方 用榧子三個。胡桃兩個。側柏葉一兩。共搗泥。泡雪水。梳頭髮。永不脫落。

治頭皮垢屑丹方 白芷、藁本等分爲末。塗頭上。次早梳之。垢屑盡去。

治頭髮生虱丹方 用水銀和燭油。擦之。卽滅。

治眉上生瘡丹方 用皂莢。燒存性。枯礬。煨透。各等分爲末。麻油調塗。

治眉毛不生丹方 用黑芝麻花。陰乾爲末。以黑芝蘇油。泡之。日擦數次。自生。

(二)用雄黃末一兩。好醋調擦卽生。

(三)用桑葉七片。日日洗之。一月復生如舊。

治鬚鬢斑白丹方 用松子肉。燈火燒灰研末。用指頭擦上。卽黑。甚驗。

丙編 幹部病的丹方

治心氣怔忡丹方 用蜜炙焦白朮。時時煎服。極效。

(二)用白蓮肉。去皮心。煮食。久之自愈。

治心胃氣痛丹方 用沉香、木香、丁香、乳香、沒藥、靈脂、前胡、各一錢。真麝香一分。共研爲末。每服七分。

開水送下立愈。

(二)用薄荷油一錢二分。依的兒性纈草丁幾五錢。以二十滴混和於糖水中服之。

(治心胃虫痛丹方) 用葱白汁一杯。飲下。隨飲真小磨麻油一杯。少頃即愈。

(二)用真川椒、真烏梅、生薑、煎湯服。即止。

(治心膈飽脹丹方) 用胡椒七粒。(研末)好酒沖服。即愈。

(治心痛徹背丹方) 用烏頭(炮)一分。附子(炮)二分。乾薑、赤石脂、川椒各四分。爲末。蜜丸。桐子大。服

一二丸。即住。

(治心中饑雜丹方) 用焦朮四兩。川連(炒)五錢。橘紅一兩。共爲末。神麴、養汁爲丸。如菉豆大。每服五

十丸。薑湯下立效。

(治心下停水丹方) 用胆礬一分爲末。溫甜酒送下。以吐盡痰爲度。

(二)用雄黃五錢。清油半碗。服下吐之。即愈。

(治惡心吞酸丹方) 用白蔻仁三枚。研細。溫酒下。數服。即愈。

丹方一千種

四五

丹方一千種

四六

治心窩潰爛丹方 用葶薺磨成粉。摻之。卽愈。

治肝氣疼痛丹方 用良薑、製川朴、五靈脂、各等分。研末。每服一錢。滾醋調下。卽止。

(二)用丹參一兩。檀香、砂仁、各一錢。水煎服。卽愈。

治肝鬱氣痛丹方 用柴胡、白朮、白芍、當歸、雲苓、各一錢半。丹皮、梔仁、各一錢。薄荷、五分。水煎服。神效。

治肝燥脇痛丹方 用大瓜蒌一個。連皮搗爛。甘草一錢。紅花七分。水煎服。

治怒氣動肝丹方 左脇作痛者。用桃仁、去皮尖。鬱金、各八分。歸鬚、五茄皮、澤蘭、丹皮、新絳、各一錢。旋

覆花(絹包)二錢。青蔥管三寸。水煎服。

(二)左脇作痛者。用薑黃、枳殼、各一錢五分。肉桂、甘草、各七分。水煎服。甚效。

治肝胃氣痛丹方 用大香附、四兩。勻作四分。一兩鹽滷拌。一兩陳醋拌。一兩燒酒拌。共曬乾燥。研末。

加高粱薑二兩爲末。攪和。每日服二三錢。薑湯下。神效。

治消渴不止丹方 用兔絲子煎汁。任意飲之。以止爲度。

(二)用生枯樓根、切十斤。以水三斗。煮至一斗。濾淨。入煉淨黃牛脂一合。慢火熬膏。瓶收。每酒服一杯。

日服三次。

(二)用猪脬十個。剪破去蒂。燒存性爲末。每溫酒服一錢。

治腎虛消渴丹方 用炒黑大豆、天花粉等分爲末。糊丸。梧子大。每黑豆湯下七十丸。日服二次。

治脾胃虛弱丹方 用真橘皮去白研末。五更安五分於掌心。銛之。卽睡。三日必效。

(二)用大鯽魚一尾。去腸留鱗。入皂礬末令滿。泥包煨存性。研末。每次服一錢。日二服。

治食積脹滿丹方 用草麻子油、牛奶等分。煮沸。入白糖少許。冷服。

(二)用枳實一個。磨濃汁。開水送下。

治食肉積滯丹方 用山查炭爲末。每服四錢。開水調服。

治食魚積滯丹方 用紅麴三合。煮爛。連渣服下。二三次。卽愈。

治牛肉積滯丹方 用乾稻草一把。煎濃汁。熱服。自消。

治食鴨積滯丹方 用淘糯米泔水。煮熱服一盞。卽消。

治鷄蛋積滯丹方 用好醋少許。飲下。卽消。

丹方一千種

四八

治鹽蛋積滯丹方 用肉豆蔻一個。煨去油。煎服。數次即消。

治糯米不消丹方 用神曲炒爲末。加木香末。鹽湯送下。其積即散。

治食麵不消丹方 用生薑汁冲好酒熱服。自化。

治食豆不消丹方 用生蘿蔔汁飲之。即消。

治索粉不消丹方 用杏仁去皮尖五十粒。蒸熟搗爛。開水冲服。即消。

治食參腹脹丹方 用萊菔子三錢。煎服。即消。

治西瓜腹脹丹方 用瓜皮煎湯解之。

治荔枝腹脹丹方 用生薑汁飲之。立消。

治食菱腹脹丹方 用荔枝壳煎湯服。即消。

治胃腕隱痛丹方 用整荷葉一個。燒灰存性。生香附末一兩。九香虫九枚。

酒炒研。以大棗去核皮。薑一兩。煮搗入上藥爲丸。日服一錢。開水送下。

治胃熱吐酸丹方 用北沙參一錢六分。元胡索（酒炒）一錢。川芎六分。

(鹽水炒)一錢。梔皮一錢半。麥冬二錢。苦桔梗七分。知母一錢。粉甘草五分。水煎服。有痰者加竹茹。法半夏各一錢。

治胃寒嘔惡丹方 用人參、丁香、藿香各二錢半。橘皮五錢。生薑三片。水二盞。煎一盞。溫服。

治翻胃嘔吐丹方 用生薑一大塊。直切薄片。勿令斷。層層摻鹽。以線紮緊。外用草紙七層包之。水泡濕。慢火煨熟。取起。搗爛。和米煎服。立止。

(二)用甘蔗汁一升。入薑汁二合。溫熱作五次服。甚效。

(三)每早用滾開水。兌冷水各半碗。服之。久服斷根。

治吐物變酸丹方 用猪板油十兩。熬去渣。白蜜八兩。煉淨。二味再入銅鍋內熬數滾。入生薑汁三兩。和勻成膏。取起。不時挑服。含化。初服一次。尙吐。連服三次。全愈。

治嘔物不化丹方 用黃糖、酒藥、陳壁土共煎湯服。外用酒藥二個。半生半煨。細茶三錢。艾葉二錢。共搗爛。茶炒。貼心窩。卽愈。

治見食卽吐丹方 用紅棗二個。(去核)胡桃二枚。(打碎)入棗內。紙包煨過。煎湯服。外用米二盞。

丹方一千種

五〇

炒黑煑熟酒藥一個共研勻貼心窩。

治乾嘔不出丹方 用甘蔗汁加生薑汁和勻溫熱服。

治酒後乾嘔丹方 用甘蔗汁飲數次極效。

治飢餓嘔吐丹方 用川椒煎湯飲即安。

治嘔吐清水丹方 用生薑一塊切開中挖一孔甘草研末五分入薑內紙裹合住煨熟取薑內甘草。

入薑一片煎湯服。

治欲嘔不嘔丹方 用楓樹皮甘草煎湯服。

(二)用車前草燈心桔木葉煎湯服。

治胸間噎隔丹方 用小兒胎髮一個以陰陽瓦焙焦存性研細末陳酒送下效。

(二)用韭汁梨汁薑汁人乳各一盞飯上蒸熟服之三日後再服極效。

治偶然呃逆丹方 用紙撚通鼻取嚏即止。

(二)雙目揚上視屋梁行數步即止。

治氣熱呃逆丹方 用柿蒂煎湯飲卽止。

治陰寒呃逆丹方 用雄黃二錢。燒酒一盞。煎七分。急令病人嗅其熱氣。卽止。

治體虛呃逆丹方 用丁香三十七粒。白蓮子去心二十七個。二味同煮爛去滓。加煨薑一片。糯米半升。煮粥食。卽止。

治呃逆日久丹方 用生薑搗汁一合。加蜜一匙。溫熱服。

治風痰眩暈丹方 用白礬一兩。細茶葉五錢。爲末。煉蜜丸。梧子大。食遠薑湯下五十九。久服痰自大便出。卽愈。

治痰氣結胸丹方 用真淨銀硃五錢。明礬一兩。同研。將熨斗盛火。瓦器盛藥。鎔化後。急刮搓丸。每服一錢。入薑汁少許服之。

治氣虛痰飲丹方 用好赤石脂一斤。研末。每服二錢。酒送下。至多服三錢。服完一斤全愈。

(二)用單瓣桃花三月三日取。不拘多少。揀淨袋盛陰乾。煎服效。

治痰厥不語丹方 用生半夏半兩。人參半兩。菖蒲二錢。兔絲子一兩。甘草三分。茯神三分。皂莢一錢。

丹方一千種

五二

生薑一錢。用水煎服。

治痰迷譫語丹方 用鮮豬心一具。辰砂一錢。甘遂二錢。二味合研爲末。入豬心中。外用牛糞煨熟。取出藥末。和作兩丸。豬心養汁和丸。吞下卽愈。

治肺癆虛損丹方 用黑豆炒熟研末。紅棗量用。煮熟去皮核。共搗爲丸。每服二三錢。鹽湯或酒下。立見神效。

治肺痿危症丹方 用大瓜萐一個。開一孔。內有子多少粒。以杏仁去皮尖。照數配入封好。外用黃泥包裹。燒紅。燒至無烟出。用物蓋住。候冷去泥。又用川貝母。照瓜萐子粒數酌入。共研細末。臨臥時每用二錢。白蜜調勻。燈心煎水下。

治寒咳不止丹方 用胡桃連皮搗爛。加冰糖少許。開水冲服。數次卽止。

治熱咳不止丹方 用真柿餅煎水服。卽止。

(二)用扁柏葉。煮豆腐食。極效。

治虛勞咳嗽丹方 用真烏梅汁。梨汁。蘿蔔汁。柿霜。白沙糖。白蜜。各四兩。薑汁一兩。赤苓末。款冬花。乳

汁浸晒乾。紫苑末各二兩。共入砂鍋熬膏爲丸。每服三錢。臨臥時含口中緩緩嚥下。

治酒後咳嗽丹方 用白殭蠶焙研末。每次茶服一錢。

治年久咳嗽丹方 用紫蘇兜煎濃汁。早晚沖雞蛋服。神效。

治老年咳嗽丹方 用豬油糯米糖蜂蜜各四兩。共熬膏。時常挑服一匙。口中含化。三五天即止。

治陰虛久咳丹方 用陳海蜃皮漂淨鹽冰糖拌蒸食。其效如神。

治咳嗽噎逆丹方 用淨麻黃紅棗皮南薄荷各五分。官桂紫蘇葉桑白皮杏仁去皮尖。大腹皮各四

分。炙甘草六分。水煎服。

治咳嗽聲啞丹方 用訶子皮五倍子五味子黃芩甘草各等分爲末。蜜丸櫻桃大。每一丸含化嚥下。

治咳嗽痰喘丹方 用真蚌壳粉新瓦炒紅入真青黛少許。用淡醃菜水滴麻油數點。調服二錢。神效。

(二)用藕汁梨汁白菓汁各二兩。銅鍋內熬膏。隨意服之。

治咳嗽氣喘丹方 用生山藥半盞搗爛。甘蔗汁半盞和勻。炖微熱服立止。

治喉內哮喘丹方 用海螵蛸瓦上焙枯爲末。大人五錢。小人二錢。紅沙糖拌勻調服。數次斷根。

丹方一千種

五四

治吐血不止丹方 用黃耆二錢半。紫背浮萍五錢爲末。每服一錢。姜蜜水下。

(二)用紫參、阿膠、甘草等分炒爲末。糯米湯調服。

治心熱吐血丹方 用生地黃汁半升。熬至一合。入大黃末一兩。待成膏。作丸梧子大。每熱水下五丸至十九。

治氣鬱吐血丹方 用香附末二錢。童便調服。

治勞傷吐血丹方 用童便或自便一杯。日日飲之。勿間。每服南棗三個。自不惡心。日飲二三次。一月見效除根。

治驟然吐血丹方 急用全當歸四兩。無灰酒二大盃。煮透飲之。如量小分日飲之。但不可牛飲。須緩緩服之。

治痰內有血丹方 用款冬花、百合、百部(蒸焙)各等分爲末。蜜丸龍眼大。每臥時薑湯下一丸。

治痰帶血絲丹方 用白芨二兩爲末。每服二錢。臨臥糯米湯下。

治肺中生癰丹方 用甘草、桔梗各三錢。煎服。每服犀黃丸。每日三錢。服至一料全愈。

治大腸生癰丹方 初起者用瓜蒌仁去油二錢。桃仁去皮尖二十粒。苡仁一兩。丹皮五錢。水煎服。卽消。

(二)用六一散。每服三四錢。多服膿血從大便出而愈。

治受寒泄瀉丹方 用胡椒大蒜作餅敷貼臍上卽止。

(二)用酒炒艾絨作餅敷之。

治五更泄瀉丹方 每至五更卽瀉瀉者用破故紙(炒)酒浸蒸用四兩。胡桃肉(去皮)四兩。五味子

(炒)三兩。吳茱萸(鹽水炒)一兩。生姜。煮棗爲丸。胡椒大每服三錢。臨臥鹽湯下。

治陽虛泄瀉丹方 泄出食物完穀不化者用生白朮。雲苓各二錢。川朴(薑汁炒)砂仁。陳皮各一錢。

生益智錢半。水煎數服卽愈。

治脾虛泄瀉丹方 用破故紙(炒)半斤。肉豆蔻生用四兩。爲末。肥棗研膏和丸。梧子大。每空心米飲

湯服五六十九。

治伏暑泄瀉丹方 用白礬(煨)爲末。醋和爲丸。量大小木瓜湯下。

丹方一千種

五六

治腎虛泄瀉丹方 用破故紙（焙乾）研末一錢。用豬腰子一個。去白筋油膜。破開將故紙末裝入。裏緊蒸熟。不用着水。食二三次即愈。

治久瀉不止丹方 用大蒜鬚加銀硃搗融。敷臍眼中立止。如神。

（二）用芡實、淮山藥各二兩。入豬肚蒸服。即愈。

治赤白痢疾丹方 用山查炭研末。紅痢加白蜜爲丸。白痢加紅糖爲丸。如紅白痢加蜜與紅糖爲丸。空心白開水湯下。每服八錢。神效。

治五色痢疾丹方 用獾皮燒灰。酒服二錢。即愈。

（二）大枯摻一個。煨爲末。作一服。溫酒下。

治噤口痢疾丹方 用鯽魚一尾。白礬五錢。以礬入魚腹內。紮定煨存性爲末。米飲湯下一錢。甚效。

（二）用大蒜搗爛貼兩脚心。並貼臍中。甚良。

治休息痢疾丹方 用熟附半兩（研）雞子白二枚。搗和丸梧子大。傾入沸湯煮數沸。濾出作兩服。米

飲湯送下。

(二)用生羊肝一具。切絲入三年陳醋中。吞之心悶則止。不悶更服。一日勿食他物。

(三)用虎骨炙黃焦搗末。飲服方寸匕。日三次甚效。

治痢疾點眼丹方 用初胎小兒糞瓦上焙乾。雄黃四分。梅片五厘。爲極細末。水調點兩眼內角。無論

赤白痢及禁口痢。危篤者皆神效。

治血痢不止丹方 用乾薑燒黑存性。候冷爲末。每服一錢。米飲湯下。

(二)用穀樹皮。荊芥等分爲末。冷醋調服一錢。極效。

治久痢不止丹方 用麻油煎鹽魚食。數次甚效。

治大小便閉丹方 用大皂角燒存性爲末。粥飲湯下三錢。卽通。

(二)用苦楝子。茴香。穿山甲各八分。牽牛子。鹽水炒錢半。水煎服。自通。

治大便秘閉丹方 用芝蔴二兩。大黃二錢。好茶葉五錢。共研末。溫水冲服。

(二)用桃花瓣一大撮。以滾水半碗冲服。

治大便秘閉丹方 用松子仁。柏子仁。芝蔴。均去油各等分。研如泥。白蠟和丸。桐子大。每服五十九黃。

丹方一千種

五八

芪煎湯下甚效。

治大便壅結丹方

用皂礬一錢。巴霜二個。同研入雞子內。攪勻封頭。溼紙裹煨熟食之。酒下即通。

治大便風秘丹方

用蒺藜子炒一兩。猪牙皂莢去皮炙酥五錢。爲末。每服一錢。鹽茶湯下。

治大便下血丹方

用猪尾腸八寸。洗極淨。以白蓮肉二兩。去心不去皮。灌入腸內。用線縛住兩頭。煮

極爛。取蓮肉少加白鹽。日食二三次。兩日內血即止。久服斷根。

(二)用蠶豆葉一大把。搗融熱酒冲入。去渣服一碗。二三次即愈。

(三)用絲瓜簾燒枯研末。淡酒冲服。神效。

治痔瘡突出丹方 用雞冠花。鳳眼草各一兩。水二盃。煎湯頻洗。

(二)用紅砒煨淨末一錢。枯礬二錢。真烏梅肉。燒存性二錢。硃砂。飛淨三分。共研極細末。用時以口浸

溼手指。蘸藥於痔頭。痔身上搓擦。一日三次。待五六日。出盡臭水。其痔乾枯。重者半月全愈。

(三)用白煮整雞蛋。蘸真象牙末。空心服之。每日二次。半月斷根。

治痔瘡成漏丹方 用夏枯草八兩。甘草節四兩。連翹四兩。爲末。金銀花一斤。煎濃湯爲丸。每晨三錢。

鹽湯送下。久服除根。

(二)用白礬、青鹽各四兩爲末。猪尿脬一箇。盛之陰乾。每服五錢。空心溫湯下。

治痔瘡作癢丹方 用蠟子不拘多少。燒烟薰之。極效。

治外痔腫痛丹方 用木鱉子水磨濃。或陳醋磨搽之。初覺甚痛。少頃卽止痛消腫矣。

(二)用鼻涕虫搗爛。和陳墨敷之。極效。

治內痔腫痛丹方 用猪大腸六兩。蚯蚓十條。煮融去蚓食腸。甚效。

治內痔不出丹方 用草烏爲末。口涎調點肛門。痔卽反出。乃可用藥敷治。

治雞冠痔瘡丹方 用赤小豆末。加黃連末敷之。

治野鷄痔瘡丹方 用槐柳煎水洗淨。再以艾絨炙七壯。甚效。

治脫肛不收丹方 用大蜘蛛一個。去頭足。瓦上焙枯研末。燈油調敷。半刻卽收。

(二)用脚魚頭焙枯研末。麻油調敷。神效。

(三)用大螺絲一個。入真梅片一分。卽時水出。敷之神效。

丹方一千種

六〇

治肛門奇癢丹方 用蛇床子、棟樹根各三錢、防風二錢、生甘草一錢、皂角五分。共爲細末。煉蜜爲條。

塞肛門內。聽其自化。一二次止癢而愈。

治蟲食糞門丹方 用蜣螂七枚。新牛糞五錢。肥羊肉一兩。炒黃同搗成膏。爲丸如蓮子大。烘熱棉裹。

納肛門中。半日大便中卽有蟲出。數次卽愈。

治疝氣疼痛丹方 用雄黃五分。飛淨爲細末。姜湯下。止痛如神。

(二)用栗炭燒紅放碗內。如好燒酒半碗。以碗蓋住飲之。

(三)用芳香礪砂精一錢。大黃丁幾二錢。芳香丁幾一錢。混和服十五滴。日服三次。

治疝氣入腎丹方 用茴香不拘多少。炒作二包。更換熨之。

治疝氣入囊丹方 用端午日穀樹葉陰乾爲末。每服一二匙。空心溫酒下。

治疝氣偏腫丹方 用老絲瓜焙枯研末。熱酒沖服。重者不過三服。卽愈。

治熱疝氣痛丹方 用芙蓉花根去心。將皮搗極融爛。加大黃末敷患處。二三日卽愈。

治寒疝氣痛丹方 用胡盧巴炒研末。每服二錢。茴香酒下。

治血疔初起丹方 用胡椒、茱萸、按按揉之。

治狐疔氣痛丹方 超越舉重而得者。用地膚子半兩、白朮二錢半、桂心五分。爲末。酒服三錢。忌食生葱。

治心疔氣痛丹方 用川烏頭、山梔子各一錢。爲末。順流水入薑汁一匙。調下。

治癰疔重墜丹方 用薏苡仁四兩、陳壁土炒水煑爲膏。數服卽消。

(二)用雄黃、白礬各二兩、甘草一兩。煎水時時泡洗。卽愈。

治橫梁疔氣丹方 小腹中有塊。直衝心胸。叫號疼痛。用破故紙一斤、黑芝麻二兩。拌炒篩去芝麻。只用破故紙。石臼中磨末。以酒爲丸。每服三錢。開水送下。

治小便不通丹方 用芒消三錢、茴香酒下。

(一)用戎鹽彈子大一丸、茯苓半斤、白朮二兩。水煎服之。

(二)用蝸牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少許。更妙。

(四)用陳棕瓦上焙存性。以水酒服二錢。卽通。

治小便不禁丹方 用白茯苓、赤茯苓等分。以酒煮地黄汁。搗膏和丸。彈子大。每嚼一丸。空心鹽酒下。

(二)用野薔薇根煎汁飲。或研末酒服。

治小便頻數丹方 用赤小豆葉一斤。加鼓汁煮和作羹食之。

(二)用雄雞腸一具。作羹和酒服之。

治小便過多丹方 用象牙燒灰飲服之。

治小便渾濁丹方 心脾不調。白如米汁者。用真川朴(姜製)一兩。真茯苓一錢。水酒各一盞。煎服極效。

小便出血丹方 血出如小便者。用當歸一兩。酒煎服。神效。

(二)用黑豆一升。炒黑研末。熱酒淋之。去渣空心飲。甚效。

(三)用蘿蔔葉搗汁。加好墨少許。飲之。

小便出糞丹方 陰陽拂逆。名曰交腸者。用猪苓錢半。澤瀉二錢。茯苓三錢。白朮錢半。肉桂七分。前

治服

治夜睡遺尿丹方 用大甘草頭煎湯。夜夜飲之。自愈。

治受寒腹痛丹方 用白芍三錢。甘草、肉桂各一錢。水煎服。卽止。

(二)用桂圓、連壳燒存性。研末酒服。屢試屢驗。

治熱症腹痛丹方 用六一散冲服三錢。最妙。

治虫疾腹痛丹方 用連鬚老葱頭搗汁。麻油調服。

治肚腹脹大丹方 亮如水晶者。用柚子皮燒灰。冲服神效。

治氣蠱鼓脹丹方 腹上按之隨手卽起者。用大癩蝦蟆一個。砂仁不拘多少爲末。將砂仁裝蝦蟆肚

內令滿。縫口黃泥封固。炭火煨紅取出。候冷將蝦蟆研末。作三服。陳皮湯送下。以放屁多爲效。二三

服全愈。

(二)用雞內金一副。沉香、砂仁各三錢。陳香櫟去核五錢。共爲末。每服一錢五分。姜湯下甚效。

治水蠱鼓脹丹方 腹上按之下陷不起者。是用大田螺四個。去壳大蒜五個。去皮。車前子三錢。研末。

共爲餅。貼臍中。以帶縛定。水從小便出漸消。終身戒食田螺。

丹方一千種

六四

治血蠱鼓脹丹方 週身老黑色。皮肉有紫黑斑點者。是用雄雞屎（炒）四兩。茜草、紫背浮萍、各一兩。老絲瓜筋半條。雄豬肚一個。去臟。將各藥裝入肚內。用麻線縫好。煮熟去藥。將肚切片。仍入原湯。加螞蝗一條。燒枯存性。乾漆三錢。煨令烟盡。炒蟲蟲真血竭真花蕊石（研）各三錢。紅花降香各五錢。綿大戟甘遂各麪包煨。芫花（醋炒）各二錢。文武火煮好去藥。食肚與湯分作二三次服。服後以大便下黑水數次爲驗。其蠱自消。忌食鹽醬一百二十日。滿日開鹽。期內用秋石可代鹽。方內螞蝗必不可少。俟病愈後。用（誤吞螞蝗方）治之。

治腹中米瘕丹方 喜食生米者。是用雞矢白米各半合。炒爲末。以水一鍾調服之。

治腹中肉瘕丹方 好食肉者。是用白馬溺三升飲之。吐出肉積可愈。

治腹內痞積丹方 用臭椿樹皮。在上中者佳。要一大束。去外粗皮。止用白皮二斤。切碎入鍋內水煎。瀝去渣。用文武火煎成膏。薄攤布上。先以生薑搓出垢膩。後以膏藥烘熱。微加撒麝香少許。貼痞塊上。其初微痛。半日後卽不痛。候其自落。一張卽永不再發。孕婦忌用。

治寸白虫疾丹方 用鴨蛋一個。破一小孔。入使君子肉末一錢。檳榔末一錢。用紙封口。蒸熟食之。蟲

隨大便而出。

(二)用蜂巢一個。燒存性。酒燉一匙。蟲卽死出。

治腹中蠱毒丹方。用蚯蚓十四條。好醋泡至蚓死。取醋汁服。甚效。

(二)用舊鼓皮。寬五寸。長一尺。薺薇根五寸。如拇指大。水一升。酒三升。煮二升。服之當下。

(三)用馬齒寬。搗汁一升。飲。渣敷痛處。日飲四五次。甚效。

治蜈蚣入腹丹方。食生雞蛋二三個。略過片時。再飲生油一杯。卽吐出。

(二)用生雞血灌之。甚效。

治臍出膿水丹方。用韭菜葉。扁拍葉。二味。共搥取汁一酒杯。加重便一茶盃。蒸服。外用蘆甘石。好醋。泡一晝夜。瓦上焙乾。研末敷之。

丁編 肢部病的丹方

治手心腫起丹方。用生附子切片貼之。或用生附子煎水泡之。更妙。數日後不痛者。必然作痛。作癢。切不可用手抓。仍用附子切片。加輕粉一分。貼之。必愈。

丹方一千種

六六

(二)用白鹽、花椒、末等分。醋和敷之。未破者極效。

治指尖螺瘡丹方 天氣不寒。指尖作冷者是。用醋和鹽調勻。將指頭泡入。自愈。

治指節生瘡丹方 用生黃豆、嚼融敷。再嚼再敷。數次即愈。

治指甲生疽丹方 用乳香、膽礬研細。時時敷之。此病須剔去甲。不藥亦愈。

(二)用甘草、嚼融厚敷。乾則隨換。數日全愈。

治穿掌腫毒丹方 用新桑葉研爛。敷之即愈。

治熱毒攻手丹方 腫痛欲脫者。用豬肪油和羊屎塗之。

(二)用水煮馬尿汁中浸之。

治手臂疼痛丹方 用當歸三兩。切酒浸三日。溫飲之。飲盡。再以三兩再浸。以瘥爲度。

治手掌皮厚丹方 用苦參酒煎服。外用苦參末酒敷。極效。

治指頭麻木丹方 用蜥蜴和銀硃共搗。擦之多。擦幾遍。不生蛇頭蛙節等疔矣。

治手了枝痛丹方 用通草研末。生鷄蛋白調敷。即愈。

治指縫痛癢丹方 用白芷、黃丹、滑石各等分。研極細末。敷之神效。

治天蛇頭毒丹方 生各指頭。又足趾頭。初起痛甚者是。急用頭髮紮住指根。取鳳仙花梗下半段。連根。不用水洗。和甜酒糟搗融敷之。半日腫消痛止。

(二)雞子清磨雄黃敷之。

治油灰指甲丹方 用鳳仙花連根蒂葉搗敷指甲上。用布包好。一日一換。月餘乃愈。

治指甲軟薄丹方 用白殭蠶燒烟薰之則厚。

治指上肉刺丹方 痛不可忍者。用葵菜食之。即愈。

治手指龜裂丹方 用羊骨髓擦裂處。自愈。

治兩足疼痛丹方 用樟木一段。打碎煎湯。遠年尿桶砂一兩。爲末。和陳小粉。調敷在大熱痛處。甚效。

治足痛如割丹方 用生薑切片。蘸香油擦痛處。隨用生薑火燒熟。搗爛敷患處。其痛立止。

治足軟難行丹方 腎虛脚軟痛極者。用杜仲一兩。半酒半水煎。連服數劑。三日能行。五日全愈。

治腳氣立愈丹方 用黃芪五錢。水煎一二服。斷根。

丹方一千種

六八

(二)用團魚一隻。白煮不用鹽味。煮至極爛。取汁服之。自愈。

治寒濕脚氣丹方 用芥子、白芷等分爲末。薑汁調和塗之。

治脚氣衝心丹方 用黑豆、一茶杯、甘草三錢。煎濃汁服。甚妙。

治脚氣入腹丹方 用吳茱萸(泡)木瓜等分。空心酒服一錢。甚效。

治脚麻不仁丹方 用手在膝彎間頻頻抓之。即愈。

治脚上生瘰丹方 用薤白、葱頭共搗汁一碗。煎再以松香四兩、麻油八兩熬至滴水成珠。方入前汁。

攤膏藥貼上即落。

治酒風脚痛丹方 用老酒糟四兩、松毛一兩共搗爛。加頂好燒酒拌入。熱敷之。用布包緊。冷則炒熱。

再敷。日夜不斷。敷至痛止乃已。

(二)用蒼朮煎酒服。即時能行甚效。

治脚出臭汗丹方 用蘿蔔煎水洗。數次即愈。

治脚冷如冰丹方 用生附子二錢、好酒麴一錢。共爲末。燒酒調敷足心。

治脚心腫硬丹方 不能履地者。用炒草烏頭。研末敷。並用炒韭菜子三錢。煎服即愈。

治脚生雞眼丹方 用真烏梅肉。搗爛。入醋少許。加鹽水調勻貼之。即消。

(二)用藜蘆一個。蕎麥一錢。共搗融貼上。一晝夜自落。

(三)用活蜈蚣。將香麻油泡一二日。取出搗爛敷之。過夜根即拔出。不至再發。

治嵌甲作痛丹方 用橘皮煎水浸洗。將趾甲剪去。再以虎骨末敷之。其痛即止。

治脚根作痛丹方 用柳葉一把。杏仁三粒。枯礬二錢。共搗爛敷之。極效。

治脚底木硬丹方 用牛皮膠。以生薑汁化開。調南星末塗上。烘物熨之。

治脚底開裂丹方 用白芨刮取細末。用口涎調敷。立刻止痛能行。

治脚底生泡丹方 用生草烏酒磨敷上。立愈。

(二)用生灰麪水調敷。一夜即平。

治脚底生瘡丹方 其大如豆。痛不可忍者。用真紅芽大戟去心。嚼融敷之。即愈。

治脚了奇癢丹方 用火爐放瓦一塊。撒韭菜子於瓦上。加入麻油兩足。向上薰之。用布圍住。勿令透。

丹方一千種

七〇

氣少刻癢止卽愈。

治脚了爛瘡丹方 用陳火腿骨、米泔水漂盡鹽味、燒枯研末敷。立效。

治脚甲腫爛丹方 用蜈蚣焙枯研末敷。外用南星末、醋調敷四圍。甚效。

治腿足痿廢丹方 用熟地、山藥、元參、甘菊花各一兩、白芥子三錢、當歸、白芍、白黨各五錢、神曲二錢。水煎服。一劑火滅、二劑火退、十劑而痿有起色。三十劑可全愈矣。

治腿脚腫爛丹方 用生黃豆將口漱淨、自行嚼爛敷之。數日全愈。

(二)用鳳仙花根葉、煮水洗。數日必愈。

治風濕腿痛丹方 用吳茱萸、一茶杯研末。以黃酒一杯拌勻。炒熱攤油紙上。敷患處。用布捆好。立時止痛。如冷再炒再敷。

治腿膝疼痛丹方 用山查肉、白蒺藜各等分。蒸晒爲末。蜜丸梧子大。每服三錢。白湯送下。久服自愈。

(二)用菊花、陳艾葉作護膝。久則自除也。

治兩膝疼痛丹方 用生黃芪半斤、遠志肉、牛膝各三兩、石斛四兩。用水十碗。煎二碗。再入金銀花一

兩煎至一碗。一氣服之。服後覺兩腿如火之熱。卽蓋被暖睡。汗出如雨。待汗散後。緩緩去被。忌風。一服病去大半。再服除根。

(二)用乳香、沒藥、各一兩五錢。地骨皮、無名異、各五錢。麝香、一分爲末。車前草、搗汁。入煮酒調敷患處。三日全愈。

戊編 婦女病的丹方

治室女經閉丹方 用凌霄花爲末。每服二錢。食前溫酒下。

(二)用茜草一兩。煎酒服之。一日卽通。甚效。

(三)用牡鼠屎一兩。炒研空心溫酒服二錢。

治月經不通丹方 用蠶沙四兩。炒半黃色。黃酒一斤半。瓦罐煎滾。瀝去蠶沙。將酒入瓶封好。溫飲一

二盃。卽通甚效。

(二)一月再見者。用土瓜根、芍藥、桂枝、廬虫、各三兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。

(三)兩三月或半年一年者。用麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熱酒一升。浸一夜。日服一升。

(四)用薏苡根一兩。水煎服。不過數服。甚效。

(五)用赤馬肝一片。炙研末。每食前熱酒服一錢。經通乃止。

治月經不調丹方 血臟冷痛者。用熟附子。去皮。當歸等分。每服三錢。水煎服。

(二)用阿膠一錢。蛤粉炒成珠。研末。熱酒服。

治月經滯丹方 用蘼荷根。細切。水煎取二升。空心入酒和服。

治月經過多丹方 用紅雞冠花。晒乾爲末。每服二錢。空心酒調下可止。忌魚腥豬肉。

(二)用木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。日一服。甚效。

治經來色淡丹方 用白朮。歸身。白芍。炙黃芪。川芎。茯苓。熟地。製香附。台黨。各一錢。炙甘草。五分。薑棗。

引煎服。

治經來色紫丹方 用製香附。生地。川芎。赤芍。黃連。歸尾。甘草。丹皮。各一錢。煎服。

治經來黃水丹方 用熟地。一錢。白芍。川芎。烏藥。元胡索。小茴香。當歸。各八分。薑棗。引水煎服。

治經來綠水丹方 用附子。三錢。鹿膠。一兩。真山藥。菴蓉。肉桂。蒲黃。炒黑。當歸。萸肉。各五錢。白芍。一兩。

熟地一兩五錢。淨烏雞肉去皮油。酒蒸三兩。米糊爲丸。空心酒送下百丸。

治經血逆行丹方 用魚膠切炒。新棉燒灰。存性爲末。每服二錢。米飲調下。卽愈。

治行經腹痛丹方 用益母膏酒冲服。卽效。

治經後腹痛丹方 用茯苓、歸身、川芎、白芍、生地、白朮、台黨、香附、醋炒、各一錢。炙甘草、木香、各五分。皮、七分。薑、棗、引水煎服。

治痛經不孕丹方 用玉蘭花未開足者。每歲一朶。每晨空心煎服。有效。

治血枯經閉丹方 用炙芪、柴胡、各七分。歸身、白芍、川芎、陳皮、各一錢。神曲、(炒)、麥芽、(炒)、炙甘草、各五分。白朮、台黨、各一錢。薑、棗、引水煎服。

治氣鬱經閉丹方 用陳皮、茯苓、蒼朮、香附、川芎、各一錢。製半夏、青皮、莪朮、檳榔、各七分。甘草、木香、各五分。薑、引水煎服。

治經閉發熱丹方 用歸身、川芎、赤芍、生地、黃芩、酒炒、黑山梔、連翹、桔梗、各一錢。生甘草、薄荷葉、各五分。淡竹葉、十片。水煎服。

丹方一千種

七四

治經閉如孕丹方 用歸身、川芎、赤芍、義朮、台黨、炙甘草、各五分。川牛膝、破故紙、炒茴香、各一錢。薑棗、

引水煎服。

治胎前頭痛丹方 用川芎、當歸、各錢半。黃芩、(酒炒)白朮、各一錢。細茶葉、二錢。水煎食後服。

治胎前口渴丹方 用生地、熟地、歸身、川芎、白芍、川柏、各一錢。水煎服。

治胎前咳嗽丹方 用川貝母、去心麪、炒黃、去麪、研末、砂糖、爲丸。如芡實、大口中含化一丸。極妙。

治胎前嘔吐丹方 用半夏、二兩。人參、乾薑、各一兩。爲末。薑汁麪、糊丸。梧子大。每服十丸。日三服。

治胎前吞酸丹方 用半夏、陳皮、茯苓、炙甘草、枳實、神曲、砂仁、台黨、白朮、各五分。薑引水煎。食後服。

治胎前惡阻丹方 用藿香葉、甘草、各二錢。香附子、二兩。共爲末。每服二錢。鹽湯送下。

治胎前心痛丹方 用草菓、一個。元胡索、八分。五靈脂、一錢。滑石、八分。酒煎半飢服。

(二)用葡萄、一兩。煎湯服卽下。

治胎前腰痛丹方 用一豬所生豬腰、一對。去白膜。青鹽、四錢。入豬腰內。火內燒枯。研末。蜜爲丸。空心

酒送下。卽愈。

治胎前腹痛丹方 用枳壳、三兩。麴炒黃芩、一兩。每服五錢。水一盞半。煎一盞服。

治胎前泄瀉丹方 用白芍、二錢。生地、川芎、當歸、各一錢。水煎服。

治胎前痢疾丹方 用當歸、黃芩、黃連、白芍、焦朮、枳壳、茯苓、生地、陳皮、生甘草、各一錢。木香、五分。烏梅、

一個。水煎空心服。

治胎前久痢丹方 用荷葉蒂、七個。燒枯存性。研末酒下。極效。

治胎前瘧疾丹方 用柴胡、錢半。台黨、黃芩、歸身、知母、白朮、各一錢。甘草、五分。薑棗、引水煎多服。以平

爲期。

(二)用夜明砂、研末三錢。空心溫酒下。

治胎前霍亂丹方 用藿香、陳皮、甘草、各一錢。白朮、條芩、紫蘇、各錢半。砂仁、炒五分。薑棗、引水煎服。

治胎前中暑丹方 用台黨、白朮、炙甘草、炙黃芪、黃芩、黃連、知母、麥冬、各一錢。五味子、十五粒。水煎服。

治胎前中濕丹方 用條芩、白朮、各五錢。蘇葉、二錢半。生薑、五片。煎水服。

治胎前中風丹方 用台黨、川芎、白芍、茯苓、生地、白朮、歸身、炙甘草、黃芩、炙黃芪、防風、羌活、秦艽、各二錢。

丹方一千種

七六

薑、棗、引水煎多服。以平爲度。

治胎前癰瘕丹方

用生甘草、威靈仙各一斤。用水一石。將藥煎五六滾。入大缸內。用板燒坐其中。周

圍用布圍住。乘熱薰之。待水溫渾身洗透。務使汗出。謹避風寒。卽愈。

治胎前感寒丹方

用大鯽魚一尾。燒灰酒服一匙。如無汗腹痛者。以醋服。

治胎前行經丹方

用赤小豆研末。陳酒冲服。日服二次。卽愈。

治胎前尿血丹方

用阿膠炒黃爲末。食前粥飲湯下二錢。自止。

(二)用丈夫指甲燒灰。陳酒下少許。

治胎前便閉丹方

用枳實二兩。水二碗。煎七分。不拘時分服。體弱者酌減。

治胎前子嗽丹方

治法同胎前咳嗽。

治胎前子懸丹方

孕婦五六月之後。胎氣不和。上凌心腹。脹滿疼痛者。是用川芎、白芍、歸身、紫蘇、陳

皮、大腹皮各一錢。薑、黨參、炙甘草各五分。葱白七寸。薑五片。水煎空心服。

治胎前子煩丹方

孕婦心驚膽怯。終日煩悶不安者。是用台黨、黃芩、知母、生地、炙甘草、麥冬、茯苓各

一錢竹茹一大團水煎空心服。

治胎前子癰丹方 孕婦忽然眩暈猝倒口噤不能言狀如中風須臾即醒醒而復發者是用台黨白朮茯苓炙芪炙甘草麥冬歸身各一錢薑棗引水煎食遠服。

治胎前子腫丹方 孕婦腹大有水氣者是用白朮二錢茯苓錢半歸身白芍各一錢生姜陳皮各五分活鯉魚一個約重八九兩煮汁一盞去魚以魚湯煎藥服甚效。

(二)用赤茯苓去皮葵子各半兩爲末每服二錢新汲水下。

治胎前子淋丹方 孕婦小便少又澀痛者是用木通生地條芩甘草梢麥冬赤芍黨參各一錢淡竹葉十五片燈心一撮水煎空心服。

治胎前子鳴丹方 孕婦或欠身向高處取物子在腹中失脫口中所含痞瘕者是令婦作男子拜狀或以百錢撒地令孕婦拾之復含着則止。

治胎動不安丹方 用絲瓜二個煎水服即愈無瓜或籐亦可。

治胎動欲產丹方 用全蛇蛻一條絹袋裝盛遠腰繫之。

治胎動下血丹方 用雞子二枚打破以白粉和稀食之。

(二)用五倍子末酒調服二錢神效。

治胎動迫心丹方 用艾葉雞子大以頭醋四升煎二升分溫服。

治臨月滑胎丹方 用赤土少許牽牛子一兩研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢。

治墮胎血溢丹方 用好墨三兩火燒醋淬三次出火毒沒藥一兩爲末每服二錢醋湯調服。

治因驚胎動丹方 用川連末酒服三分每日三服。

治撲跌胎動丹方 砂仁炒透去筋膜研末每服二錢熱酒冲服甚效。

治臨盆難產丹方 用白芷五錢水煎服。

(二)用蜀葵子二錢滑石三錢爲末順流水服五錢卽下。

(三)用黃葵花研末熱湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去滓服之。

治臨盆逆產丹方 用蜂蜜真麻油各半鍾煎至一半服產順立下。

治臨盆橫生丹方 用灶心土研細末服一錢酒調仍搽產婦臍中自下。

治盤腸生產丹方 生時子腸先出。產後不收者。用蓖麻子四十九粒。去壳搗爛。貼在頂心。候腸收盡而急去之。

(二)用半夏末。頻嚙產婦鼻中。則上也。收盡去之。

治討鹽生產丹方 用食鹽少許。點小兒手足心。即縮入。兒即順生矣。

治臨產謔語丹方 胡言亂語者。用四焰燈火。加硃砂。入盞內點之。即安。四焰者。一盞內用四燈頭是也。

治臨產暈絕丹方 不省人事者。用生半夏如豆大研末。吹鼻中得嚏。即活。

治交骨不開丹方 用白蜜或麻油半盞。煎至一半服之。立效。

治胞衣不下丹方 用明礬三分。研末。開水沖服。即下。

(二)用紅花酒養汁。飲二三盞自下。

(三)用生地黃汁一升。苦酒三合。相和煖服。

(四)用雄雞一隻。連毛破開。去腸雜。蓋產婦臍上。雞頭向上。以布紮縛。即下神效。

丹方一千種

八〇

(五)用生鷄蛋兩個。去黃用白。好陳醋燒開。沖服卽下。

治子死腹中丹方 用醋炒黃牛糞。敷肚腹上。用布摺好。卽下頗驗。

(二)用芒消末二錢。童便溫服。無不效者。

治產腸不收丹方 用刀磨水。少許。灑潤腸下。另用真磁石煎水一盃。兌酒服。自然收上。

(一)用新鮮鯽魚。焙枯研細末。一半擦腸。一半酒服。卽時收上。

治產門不開丹方 用石灰一斗。熬黃。以水二斗投之。澄清後重洗。

治風入產戶丹方 用鯉魚一尾。尺許長。浸童便內一夜。明晨以文火炙熟去皮。空心頓服。勿用鹽料。

治子宮脫出丹方 治法同產腸不收。鯽魚方甚效。

治尿脬脫出丹方 用棕樹根。和猪瘦肉。煮去根。食肉與湯。三五次自收。甚效。

治尿脬破損丹方 用大鯉魚一尾。取魚鱗。用油煎極酥脆。加鹽醋薑汁拌鱗。蒸食有效。

治惡露不下丹方 用大黑豆。炒令烟絕。酒淋服。卽下。

治惡露不止丹方 小腹刺痛者。用當歸(酒洗)生地黃芍藥各二錢。川芎錢半。元胡索(炒)蒲黃。

(炒)乾姜各等分水煎服。

治產後血暈丹方 用五靈脂半生半炒。每服一錢。白滾水調下。入喉卽愈。

(二)用白紙三十張。燒灰熱酒冲服。甚效。

(三)用乾荷葉。燒灰。溫酒調服。

治產後血渴丹方 用麥冬、黃芩等分。水煎溫服。

治產後血閉丹方 用益母膏一小杯。入酒一碗。溫服。

治產後血脹丹方 用當歸二錢。炮乾薑五分。爲末。每服二錢半。水一盞。煎八分。入鹽酒少許。熱服甚效。

(二)用芭蕉根搗汁。溫服二三杯。有效。

治產後血悶丹方 用紅花一兩。爲末。分作二服。酒二盞。煎一盞。連服。加重便尤妙。

治產後血滯丹方 用生薑五兩。切片。水煮服。

治產後尿血丹方 用牛膝煎湯頻服。甚效。

丹方一千種

八二

治產後亡血丹方 用三七研末。米湯下一錢。

治產後血滲丹方 滲入大小腸者。用車前草。搗汁一盃。入白蜜一匙。和煎一滾。分二服。飲之甚效。

治產後血亂丹方 奔入四肢。違墮者。用狗頭骨。燒灰。酒服二錢。甚效。

治產後血攻丹方 下血不止。心悶面青。身冷欲絕者。用新羊血一盞。飲之。二三服有效。

治產後血痛丹方 用菴蘭子一兩。水一升。童子小便二盃。煎服。

治產後惡血丹方 用乾地黃末。每食前熱酒服一錢。連服三次。有效。

治產後瀉血丹方 用紫菀末。水服五撮。可止。

治產後鼻血丹方 用荊芥穗炒研末。童便調服三錢。即愈。

治產後頭痛丹方 用川芎當歸各五錢。蔥頭連鬚五個。生薑五片。焙。水煎食後服。

治產後心痛丹方 用生地歸身獨活吳茱萸炒白芍酒炒乾姜炒遠志肉桂甘草炙各一

錢。細辛五分。水煎熱服。

治產後身痛丹方 用當歸肉桂白朮牛膝黃芪獨活生薑各一錢。炙甘草萆白各五分。水煎服。

治產後腹痛丹方 用當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分爲二服。數服卽愈。

(二)用精羊肉半斤。當歸川芎各五錢。生薑一兩。水十盞。煎三盞服。

(三)用羊肉燉老薑食卽止。

治產後脇痛丹方 脇下脹痛。手不可按者。用歸尾川芎青皮枳殼香附童便浸紅花桃仁各二錢。水煎入童便一鍾服之。

(二)脇下作痛。喜人按者。用歸身白芍熟地俱酒洗。黨參甘草陳皮肉桂各一錢。姜棗引水煎服。

治產後腰痛丹方 用當歸川芎白芍桂心敗醬草各六分。煎分兩服。忌食葱。

治產後腹脹丹方 用麥芽一合爲末。酒調服。有效。

治產後腹大丹方 用樟柳根三兩。大戟一兩半。炒甘遂一兩。爲末。每服二三錢。熱湯調下。大便宜利爲度。

治產後口乾丹方 用雞子一枚。打破。水一盞攪服。

治產後口渴丹方 用台黨麥冬生地瓜蒌根炙甘草各二錢。先取淡竹葉十片。粳米一合。煎湯一碗。

去米葉加生薑三片。棗三枚。煎七分溫服。

(二)用煉過白蜜不拘多少。開水調服。

治產後嘔逆丹方 用白朮一兩二錢。生姜一兩五錢。酒水各二升。煎一升。分三服即愈。

治產後嘔水丹方 用韭菜搗汁。入薑汁少許。和服自止。

治產後舌出丹方 用丹砂末敷之。自收。

治產後呃逆丹方 用丁香。白蔻仁各半兩爲末。桃仁煎湯和服一錢。數次即愈。

治產後咳嗽丹方 胸膈脹悶者。用知母。貝母。雲苓。黨參。杏仁。桃仁各一錢。水煎食後溫服。

(二)發熱惡寒。鼻塞聲重。或多噴嚏。鼻流清涕者。用旋覆花(絹包)赤芍。前胡。半夏。荊芥穗。甘草。杏仁。

茯苓各一錢。桂枝。五味子各五分。姜。棗。引水煎。食後溫服。無汗者加麻黃。去桂枝。

治產後氣喘丹方 急用鞋底烘熱。於小腹上下熨之。次用熟附子五錢。丹皮。乾漆渣。炒烟盡各一兩。

共爲末。用醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和末爲丸。桐子大。每服五十丸。溫酒下。

(二)用蘇木二兩。水二盞。煎一盞。去木加台黨末一兩。隨時加減調服。

治產後水腫丹方 用澤蘭、防己等分爲末。每服二錢。酸酒下。自愈。

治產後蓐勞丹方 用白茯苓一兩。人參、當歸、黃芪、川芎、炒白芍、熟地、桂心各五錢。豬腰一對。以水三盞。入豬腰并薑、棗各三事。煎二盞。去渣。入前藥半兩。煎一盞。服之。久服自愈。

治產後虛汗丹方 用黃芪、當歸各一兩。麻黃根二兩。每服一兩。煎湯下。

(二)用猪膏、白蜜各一升。酒五合。煎五上五下。每服一匙。

治產後盜汗丹方 用牡蠣粉、麥麩(炒黃)等分。每服一錢。用鮮猪肉湯下。

治產後自汗丹方 用黃芪、白芍(酒炒)各二錢。當歸三錢。生薑五片。水一盞半。煎一盞。溫服。自止。

治產後寒熱丹方 用殺羊角燒末。酒服一小匙。

治產後煩悶丹方 用羚羊角燒末。東流水服一小匙。未愈再服。必效。

(二)用白犬骨燒研。水服一小匙。

治產後瘡疾丹方 用台黨、北柴胡、半夏、炙甘草、歸身、酒洗川芎、乾薑三分。棗三枚。不拘時煎服。

治產後中寒丹方 用白朮一兩。澤瀉一兩。生薑五錢。水一升。煎服。

治產後霍亂丹方 用黨參、白朮、炙甘草、乾姜（煨）、陳皮、藿香、厚朴、姜三片。水煎。時時溫服。

治產後泄瀉丹方 用白朮二兩、黨參、炮乾姜、甘草一兩。共爲末。蜜丸。米湯下。

治產後痢疾丹方 用大荆芥穗四五頭。於盞內燒存性。不得犯油火。入麝香少許。以沸湯些須調下。

（二）用蒼耳葉、搗絞汁。溫服半盞。日三四服。可止。

治產後淋痛丹方 用生地、赤芍、木通、去皮、甘草梢、麥冬、黃柏、知母、肉桂各一錢。燈心一扎。水煎調滑。

石末、甘草末、辰砂末二錢服之。

治產後遺尿丹方 用雞窠草燒末。酒服一錢。卽止。

治產後中風丹方 用荆芥穗子微炒爲末。每服三錢。豆淋酒調服。或童便調服。神效。

治產後肝風丹方 用歸身、白芍、肉桂、炙甘草各二錢。生姜五片。炙芪、台黨各一錢。製附子五錢。大棗

三枚。水煎服。忌食茶水。

治產後不語丹方 用石菖蒲、石蓮肉、人參各等分。每服五錢。煎服。

（二）用生白礬末一錢。熱湯調下。每日一服。自愈。

治產後狂語丹方 用生薑、附子、生毛爲末。每服二錢。薑棗引水煎服。

治產後顛狂丹方 用辰砂二錢。研細飛淨。乳汁半盞。調溫以紫項蚯蚓一條。入藥滾之。刮淨去蚯蚓。不用入無灰酒。一盞。分作四次服。有效。

治產後冒風丹方 用乾蚱蜢數十只。焙存性。陳酒調服。甚效。

治產後風癱丹方 用台黨、當歸各三錢。茯苓一錢。黃芪、白朮各二錢。半夏八分。陳皮、炙草各五分。水煎服。

(一) 用大紅野薔薇花子一兩。酒煎服。卽愈。如日久兩手仍不能提舉者。用薔薇花四兩。當歸二兩。紅花一兩。浸酒五斤。每日隨量飲酒。甚者兩料全愈。

治乳汁不通丹方 用貝母、知母、牡蠣粉各等分爲末。用豬蹄煮湯調服二錢。卽通。

(二) 用鮮蝦肉搗爛。陳酒熱服。盡量飲之。

(三) 用赤小豆煮湯飲之。

治乳孔塞痛丹方 用胡桃肉數個。搗爛滾酒沖服。

治乳流不止丹方

用台黨、炙芪、熟地、各四錢、白芍（酒炒）、焦朮、茯苓、上桂、研末、沖服、當歸、各二錢、川

芎、錢半、炙甘草、一錢、水煎服、自止。

治乳多發脹丹方

用紅草、歸尾、赤芍、牛膝、各一錢、服、愈。

治乳頭破裂丹方

用胭脂、和蛤粉、以水調敷、靈驗異常。

治乳起結核丹方

用山慈菇、一錢、胡桃肉、三枚、共搗爛、每日以酒送服、散去爲度。

治乳上溼瘡丹方

用蜂巢、五錢（煨）、輕粉、五分、冰片、一分、共研末、用銀花、煎水、調搽、兩三次即愈。

治乳上生癰丹方

用炒白芷、製乳香、製沒藥、浙貝母、當歸、各等分、研末、每服五錢、酒送下、一服全消。

（二）用生蒲公英、搗爛、沖酒服、渣敷乳上、略臥片時、數次即愈。

治乳上生巖丹方

乳內忽生一小粒、初起如豆、大漸大如塊、不癢、不痛、有至二三年、漸漸腫痛潰爛。

亦有初起色白堅硬一塊、作痛異常、此乃陰疽、最爲險惡、急宜速治、初起者、用犀黃丸、每服三錢、酒

下十服、全愈。

治乳上生癰丹方

用天仙子、不拘多少、以開水拌成一餅、將餅貼在患處、不可使乾、稍乾仍用開水

潤潮貼之一週時即愈。

治婦人血崩丹方 用真大生地、二兩。切片。以好紹酒浸透。搗爛如膏。取汁。再用當歸、川芎各五錢。煎好。和生地汁攪勻服之。

(二) 用陳蓮蓬壳五錢。棉花子三錢。共燒灰存性研末。米酒冲服。奇效非常。

(三) 用旱蓮草、煮雞湯食之。立效。

(四) 用谷樹皮、荊芥各二錢。煎服甚效。

治崩久成漏丹方 用鹿角霜、柏子仁(炒)、歸身、茯神、龍骨(煨)、阿膠、蛤粉炒成珠各一兩。川芎七錢。香附、醋製二兩。炙甘草五錢。川續斷一兩五錢。共爲末。山藥五兩。研末煮糊爲丸。每服五十九。空心溫酒下。

治崩漏五色丹方 用蜂窩焙枯研末五分。溫酒下神效。

治婦人白濁丹方 用鹿角屑焙黃研末。溫酒冲服二錢。甚效。

治婦人白帶丹方 用白芷四兩。以石灰半斤。淹三宿。去灰切片。炒研末。酒服二錢。每日二服。自愈。

丹方一千種

九〇

(二)用酒及艾葉、煮鷄蛋、日日食之、日久自止。

治婦人白沃丹方

用礬石、燒杏仁、一分、研勻、煉蜜丸、棗核大、納入子臍中、每日一換、即愈。

婦治人白淫丹方

用糙糯米、花椒、等分、炒爲末、醋糊丸、梧子大、每服三四十丸、食前醋湯下。

治赤白帶下丹方

用葵花、一兩、陰乾爲末、每日空心溫酒服二錢、赤帶下用赤葵、白帶下用白葵。

(二)用蕎麥、炒黑爲末、雞子白、和丸、梧子大、每服五十九丸、鹽湯下、日三服。

(三)用眞秋石末、蒸棗肉、搗丸、梧子大、每服六十九丸、空心醋湯下。

治五色帶下丹方

用白馬左蹄、燒灰、酒服一匙、甚效。

治帶下有膿丹方

用鴿糞、一兩、炒微焦、白朮、麝香、各一分、赤芍、青木香、各半兩、延胡索、炒赤、一兩、柴

胡、三分、爲末、溫無灰酒、空心調服一錢、候膿盡即止。

治室女白帶丹方

用鹿茸酒、蒸焙二兩、金毛狗脊、白斂、各一兩、爲末、用艾煮醋、打糯米、糊丸、桐子大

每溫酒下五十九丸、日二服、自愈。

治婦人陰脫丹方

用絹盛蛇牀子、蒸熱熨之、其功甚效。

(二)用烏梅十四個。蛇床子五兩。煎水日洗五六次。即愈。

(三)用羊脂煎成膏。頻頻塗之。有效。

治婦人陰挺丹方 用水仙花瓣。搗極融爛。和以赤糖。敷挺上。神驗無匹。

治婦人陰痛丹方 用礬石三分。炒甘草末半分。綿裹導之。取瘥。

(二)用牛膝五兩。酒三升。煮取一升半。去渣分三服飲之。神效。

治婦人陰癢丹方 用狼牙草二兩。蛇牀子三兩。煎水熱洗。即止。

(二)用小薊煮湯。日洗三次。即愈。

治婦人陰腫丹方 用枸杞根。煎水頻洗。自消。

治婦人陰瘡丹方 用凌霄花爲末。鯉魚腦或胆調搽。甚效。

治婦人陰蝕丹方 用肥豬肉煮汁常洗。一日數遍。見效。

治婦人陰冷丹方 用五味子四兩。研末。以口水和丸如棗核大。頻納陰中。即愈。

治婦人陰癰丹方 硬如卵狀。隨病之左右者。用穿山甲之左右邊五錢。以沙炒焦黃爲末。每服二錢。

酒下。

治婦人疝痛丹方 用馬鞭草一兩。酒煎。塗服。以湯浴身。取汗甚妙。

治玉門寬冷丹方 用硫黃煎水頻洗。

治交接違禮丹方 交接後。血出不止者。用青布同髮燒灰納之。

(二)用雄雞冠血塗之。亦良。

已編 小兒病的丹方

治小兒緊唇丹方 用赤莧菜搗汁洗之。將雞屎白研末敷上。有涎換去。自愈。

(二)用蛇蛻燒灰。拭淨患處。敷之甚效。

治小兒鵝口丹方 俗名雪口。患此者不能吮乳。用甘草、黃連等分煎湯。以絢裹指拭去白點。取桑白皮汁塗之。立愈。

(二)滿口白爛者。用貝母去心爲末。半錢。水五分。蜜少許。煎三服。繳淨抹之。日四五度即愈。

(三)用白芨末和乳汁調塗足心。自愈。

治小兒疳瘡丹方 用粟子生嚙敷之甚效。

治馬牙疳瘡丹方 牙齦生白泡者是用指摘去其頭。倘有血出。以棉拭去。用白殭蠶（去絲嘴）人中

白四分。冰片一分。共研末。擦患處。略俾片刻。用絹蘸茶洗淨再擦。一日三四次自愈。

（二）用馬齒莧根。瓦上焙乾。加雄黃少許。研末吹之。

治生螳螂子丹方 兩腮腫硬有核。噤口不能吮乳者。是用蜒蛭一條。銀硃一錢半。同研爛。搽腫硬處。勿令擦去。卽消。

（二）用桑柴灰少許。入雄雞冠血二三滴。再加鹽露一匙。和勻時時搽之。亦效。

治生瘡癩頭丹方 小兒頭爛不愈者。是用銅青。瀝青。松香。各一錢。草麻子四錢。共搗勻。視患大小。以布攤藥貼之自愈。

治初生無皮丹方 用粳米粉。撲之。肌膚自生。

治週身脫皮丹方 用黃柏。灸焦研末。和猪胆汁敷之。有效。

治身如蛇皮丹方 用白殭蠶爲末。或加蛇退。研末。煎湯洗之。卽愈。

丹方一千種

九四

治身如魚泡丹方

初生身如魚泡如水晶者。破則流水。用蜜陀僧爲末。搽之。

治遍身發黃丹方

用生地、花粉、茵陳、各一錢。煎服。自愈。

治遍身紅赤丹方

用生地、花粉、甘草、連翹、各一錢。煎服。外用浮萍、水苔、搗爛絞汁。調朴硝、麝石敷之。

治小兒赤遊丹方

用蒲蘘煎汁洗之。卽愈。

(二)用真黃芽菜搗敷。神效無匹。

治小兒赤丹丹方

用胡荽搗自然汁塗之。良。

(二)用蓖蘇子五個。去皮研入麵一匙。水調塗之。甚效。

治遊風丹腫丹方

用油菜搗爛貼之。頗效。

治小兒目赤丹方

初生眼目紅赤腫爛者。用蚯蚓泥搗敷。額門。乾則再換。三次卽愈。

(二)用甘草、豬胆汁泡過。焙乾研末。每用一二分。乳汁調服。

(三)用雄雞胆、燈芯、蘸點極效。或用人乳、蒸川連、點之。亦效。

治小兒門睛丹方

用白附子(炮)、肉桂、全蠍(炒)、川芎、屎黃、石膏、各一錢。藿香、白芷、各二錢。共爲末。

蜜丸。芡實大。每服一二丸。薄荷湯送下。

治小兒雀目丹方 用羯羊肺一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。

(二)用夜明砂炒研。豬胆汁和丸。綠豆大。每米飲下五丸。久服漸愈。

治小兒目醫丹方 用雪白鹽少許。燈心蘸點。日三五次。不痛不礙。屢用有效。

治小兒耳瘡丹方 用蕎麥根一味爲末。粗者煎湯洗。細者香油調敷。

治小兒月蝕丹方 生於耳後者。用黃連搗末敷之。自愈。

(二)用龜甲燒灰。研細末敷之。甚效。

治小兒胎毒丹方 用紫甘蔗皮一兩。粉口兒茶五錢。血竭二錢。梅片四分。共爲末。豬胆汁調搽。神效。

(三)用桐油調輕粉塗之。多年不愈者皆效。

(三)用米鍋浮面濃汁。將患處洗淨。取燕子窩泥。用麻油調敷。數日可愈。

治小兒慢驚丹方 因吐泄後而成者。用麻黃長五寸十個。去節。白朮二大塊。全蠍二箇。生薄荷葉。包煨爲末。二歲以下服一錢。三歲以上半錢。薄荷湯下。

丹方一千種

九六

(二)用白殭蠶、蝎稍等分。天雄尖、附子光各一錢。微炮爲末。每服一字。或半錢。以薑湯調灌之。甚效。
治小兒急驚丹方 用栗色龍眼壳十二個。細茶三錢。陳皮三錢。姜皮三分。白鹽三分。用水一碗。煎至

五六分。灌入口內。葱然發哉。其兒必生。

(二)用芙蓉嫩葉、男單女雙。搗爛。用雞蛋和入。煎熟作餅。貼兒臍上。冷則隨換。立愈。

治小兒驚熱丹方 用鈎藤一兩。消石半兩。炙甘草一分。爲末。每服五分。溫水服。日服三次。卽愈。

(二)用天竹黃二錢。雄黃、牽牛末各一錢。研勻。細凡粟米大。每服三五丸。薄荷湯下。

治小兒驚死丹方 用蜀漆炒二錢。左牡蠣一錢二分。漿水煎服。當吐痰而愈。

治小兒卒死丹方 用葱白。納入下部。及兩鼻孔內。得嚏氣通可活。

治小兒癩疾丹方 用犀角。磨濃水服之。立效。用末冲服亦可。

(二)用雄黃、朱砂等分爲末。每服一錢。猪心血和蠶水調下卽安。

治小兒狂語丹方 用竹瀝一酒杯。夜服卽愈。

治小兒臍風丹方 小兒生七日內。面赤喘噎者是。臍上定起有青筋一條。自臍而上衝心口。看此筋

未至心口時。用艾絨如小黑豆大。在青筋頭上燒之。此筋卽縮下寸許。再從縮下之筋上燒之。筋漸卽消。而病痊矣。

治肚臍腫出丹方 用煨牡蠣大黃各五分。朴硝一錢。爲末。多用田螺浸水。調一二錢敷臍上。其水從小便而消。如啼哭不止。用台烏藥煎水服。卽止。

(二)用紅飯豆、淡豆豉、南星(去皮臍)白歛各錢半。共爲末。將芭蕉自汁調敷臍之四旁。卽愈。

治臍出膿血丹方 用煨龍骨一錢。輕粉五分。黃連一錢。枯礬五分。麝香五厘。爲末。乾摻臍中。

(二)用車前子炒焦爲末。敷之卽愈。

(二)用馬齒莧焙枯爲末。敷之亦愈。

治臍中潮濕丹方 用當歸爲末。摻之甚效。

治晝啼不止丹方 用台烏藥一錢。煎水服之。神效。

治夜啼不止丹方 用蟬衣七個。去頭足。取下半截。炒研末。以薄荷二三分。煎水調服。立止如神。

(二)用硃砂磨新汲水塗心窩。及兩手足心五處。甚驗。

丹方一千種

九八

(三)雞窩中草安蓆下。勿令母知。卽止。

治啼哭面紅丹方 用吳茱萸四錢。好醋調敷兩足心。日換數次。過一夜卽愈。

治啼哭曲腰丹方 用淡豆豉、生薑、葱白、細切。鹽共炒熱。以手巾包熨肚上立止。

治身癢叫啼丹方 用生薑、搗爛。稀布包裹。擦擦身上甚效。

治小兒腹痛丹方 啼哭吐乳。大便青色。狀若驚搐。冷汗者。用薑黃一錢。沒藥、乳香二錢。爲末。蜜丸。

子大。每服一丸。鉤藤煎湯化下。

治小兒腹脹丹方 用父母指上爪甲。燒灰存性。敷乳上。令兒吮服。

治小兒疳積丹方 用立秋後大蝦蟆。去首足腸。以清油塗之。陰陽瓦炙熟食之。積穢自下。連服五六

枚全愈。

治疳積瞎眼丹方 用草決明四兩。曬乾勿見火。研細末。生雞肝不落水者。將雞肝搗爛。和決明末三

錢。研勻加酒。飯上蒸熟服之。如腹脹如鼓。加蕪荑茶一錢。目翳腹大。加雞內金更效。

治小兒卵腫丹方 用廣木、香枳壳、麩炒二錢半。炙甘草二錢。水煎服自愈。

(二)用蚯蚓泥以薄荷汁和勻塗之其腫卽消。

(三)用礬砂一分水研塗之頗效。

治小兒遺尿丹方 用大甘草頭煎湯每夜服之自止。

(二)用赤小豆葉搗汁服之卽愈。

治小兒尿血丹方 用升麻五分水五合煎一合服之一歲兒一日一服卽止。

治小兒胎疳丹方 用烏骨雞蛋浸本人小便內七日清水洗淨每日清晨空腹煮食一枚十餘枚卽愈。

治小兒陰瘡丹方 用狼牙草煮濃汁洗之自愈。

(二)用貓頭骨不拘多少燒灰敷之卽愈。

治小兒龜胸丹方 用大黃酒拌九蒸九晒桑白皮甜葶藶熟石膏各八分天冬杏仁去皮尖木通各一錢二分水煎臥時服。

治小兒龜背丹方 用龜尿摩其胸久之自愈。

(二)用龜對鏡照之。卽有尿出。取尿調首烏末敷背上。日久卽愈。

治小兒頸軟丹方 用附子、去皮臍、天南星各二錢。爲末。薑汁調攤。貼天柱骨。甚效。

治小兒心痛丹方 用白烏骨雞屎五錢。晒研。松脂五錢。爲末。葱頭汁和丸。桐子大。黃丹爲衣。每醋湯服五丸。忌冷硬物。三四日立效。

治小兒蛔痛丹方 用使君子仁爲末。米飲五更調服一錢。卽止。

治小兒咽腫丹方 用牛蒡根搗汁。緩緩嚥之。卽消。

治小兒下痢丹方 用黃連煎濃湯。和入白蜜。日服五六次。卽愈。

(二)用枳實磨濃汁一錢。開水調服。

治小兒血痢丹方 用蔓菁搗汁。或子煎濃汁亦可。加蜜和服。

治小兒吐瀉丹方 用芹菜切斷不拘多少。煮汁服之。

治小兒胎瘡丹方 用冰糖五錢。每日煎湯飲之。十日必愈。或以蟬衣二兩。包好作枕。與兒睡之。其瘡

亦止。

治小兒瘡癤丹方

用黃丹二錢。蜜水調服。冷者酒服。

治小兒盜汗丹方

用麻黃根三分。陳蒲扇灰一分。爲末。以乳汁服。每日三次。再以乾薑三分。同爲末。

三分撲之。

治小兒自汗丹方

用雷丸四兩。粉半斤。共爲細末。撲之自愈。

治小兒吐乳丹方

用米七粒。燒黑。水半酒杯。乳半酒杯。煎至五分。服下不吐。

治小兒缺乳丹方

小兒無乳。百物不食。無法可施者。用真南棗。於飯上蒸熟。與兒食之。

治小兒傷乳丹方

用大麥麴。微炒。水調服一錢。

治兒不食乳丹方

用大蔥頭一個。切四片。乳汁半盞。同煮。分作四服。卽能食乳矣。

治顙門腫大丹方

用黃柏末。水調塗兩足心。卽愈。

治頭縫不合丹方

用乾薑七錢。細辛三錢。肉桂五錢。共爲末。薑汁和敷頭上。小兒面赤卽愈。

治小兒咳嗽丹方

用真山藥。煮熟。加糖調服。神效。

治小兒痰喘丹方

用胡桃。連皮搗融。麥芽煎湯。加冰糖沖服。喘止痰消。

(二)用瓜蒌實一枚。去子爲末。以寒食麪和作餅。炙黃再研末。每服一錢。溫水化下。日三服甚效。

(三)用巴豆一粒。搗爛綿裹塞鼻。男左女右。痰卽自下。

治小兒鹹哮喘丹方 用脂麻穢瓦上燒存性。出火毒研末。以淡豆腐蘸食之。

(三)用鼠屎燒研末。水酒空心服之一歲一錢有效。

治小兒風熱丹方 用玄精石一兩。石膏七錢半。龍腦半兩。爲末。每服五分。新汲水下。

治小兒風寒丹方 用荊芥穗半兩。(焙)麝香龍腦各一字爲末。每服半錢。茶水下。

治小兒乳癰丹方 用白殭蠶不拘多少。去嘴爲末。煎湯洗之。然後用真青黛黃柏枯礬雄黃百藥煎。

硫磺華各等分研末。濕則乾擦。乾則香油調擦。以愈爲度。

治小兒手軟丹方 用薏仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活各五錢。共爲末。蜜丸芡子大。荊芥湯送下。

治小兒便閉丹方 用連鬚蔥頭七個。生薑一大塊。豆豉食鹽各三錢。同搗作一餅。焙熱掩肚臍上。帶

紫良久自通。

治小兒便血丹方 用生地黃取自然汁。入蜜少許。和勻溫服。男女皆效。

治小兒脫肛丹方 用螺絲二三升鋪在桶內坐之少頃即愈。

(二)用荊芥皂角等分煎湯洗之亦效。

治陰囊發腫丹方 用老杉木燒灰存性加宮粉和清油調敷甚效。

(二)用蟬退一兩煎湯洗再用生紫蘇葉搗成泥包之而愈。或用乾紫蘇研末濕則乾敷乾則香油調敷。雖皮破子出悉有神效。

治陰縮入腹丹方 用硫黃吳茱萸各五錢爲細末研大蒜調塗臍下以蛇床子微炒布包熨臍即下。

治小兒吃泥丹方 用好黃土煎黃連汁搜之曬乾與食自愈。

治小兒吞錢丹方 用葶藶搗汁多服之錢自消去。

庚編 痲痘病的丹方

治痲發不起丹方 凡痲子發而不透氣喘欲絕者用脂麻五合以滾水泡之趁熱薰頭面即發。薰時將木盆置帳中坐兒其上薰之庶無風邪襲入也。

(二)用沉香木香檀香不拘多少於大盆內焚之抱小兒於烟上薰之即見起色。

丹方一千種

101

(二)用紅壳小米煎水不拘時服亦效。

治麻症作癢丹方 用好白蜜調水以鵝毛時時蘸掃甚效。

治出痘不快丹方 用韭菜根煎湯服之即發。

(二)用蘿蔔子生研爲末米飲湯調服二錢甚效。

治出痘作癢丹方 用蟬衣炙甘草各一錢煎湯服之。

治出痘聲啞丹方 用甜櫻桃核二十枚砂鍋內焙黃煎湯服。

治痘瘡煩渴丹方 用瓜萐炙甘草等分煎湯服之便不思渴。

治痘瘡狂亂丹方 用粉甘草一兩爲末水飛滑石六兩硃砂二錢麝香一分梅片三分白蜜少許每

服三錢燈草湯調服。

治痘瘡脹痛丹方 用白芍研末好酒調服五分即止。

治痘瘡煩喘丹方 用鼈甲二兩燈心草一把水碗半煎六分分二服飲之。

治痘瘡便閉丹方 用肥豬臙一大塊水煮熟切如豆大小塊食之自然臟腑滋潤自下。

治痘瘡疳蝕丹方

用已出蠶蛾繭不拘多少。以生白礬末。每個填滿。煨枯爲細末。擦之神效。

治痘瘡成疔丹方

用馬齒莧同猪骨髓少許。搗融敷於四圍。頃刻止痛。不數日能拔疔根。屢試屢驗。

(二)用明雄黃二錢。胭脂膏五錢。共爲細末。將痘疔或惡痘刺出黑血。敷之神效。

治痘瘡稠密丹方

用生犀角水磨濃汁。飲之甚效。

治痘瘡變黑丹方

用海金沙煎酒塗敷身上。其黑自退。

(二)用蛤粉炒穿山甲爲末。加當門子少許。每服五分。溫酒調服。卽發紅色有效。

治痘瘡噤氣丹方

用半夏一升。泡七次。生姜半升。水七升。煮一升。半分服。

治痘瘡黑陷丹方

用不落水猪心血和冰片爲丸。如芡實大。每服一丸。以紫草煎酒下。少刻下瘀血。

神清。痘卽紅活。透出百發百中。神驗非常。

治痘瘡倒靨丹方

用人中白。火煨爲末。溫水服三錢。靨者自出。

(二)用簪葉燒灰一錢。加麝香少許。酒服甚效。

治痘瘡倒陷丹方

用乾胭脂三錢。胡桃壳一個。燒存性。研末。用胡荽煎酒服一錢。再服卽效。

丹方一千種

108

治痘瘡潰爛丹方 用黑大豆研粉敷之即愈。

(二)用蕎麥粉頻敷之亦效。

治痘瘡不收丹方 用象牙屑在銅器內炒黃爲末。每服七八分。或一錢。開水送下自愈。

治痘瘡不起丹方 用葶藶搗絞汁和酒釀原露。燉稍溫服之。即有起色。

治痘毒入心丹方 始有白泡。忽搐入腹。漸作紫黑色無膿。日夜叫亂者。用鬱金一枚。甘草二錢半。水

半盞。煮乾去甘草切片。焙研爲末。入真龍腦。炒五分。每用一錢。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過

二服即愈。

治痘入目中丹方 用雞子壳燒研入冰片少許點之。

(二)用馬屁勃蛇退各五錢。皂角子十四箇爲末。入罐內鹽泥固封。燒存性。研細。每溫酒服一錢。數服

自愈。

(三)用豬血點之。可不生翳。或以鯉魚尾血點之。即移開甚效。

治痘不入目丹方 發痘時。預先用麝脂。嚼汁點入目中可免。

治痘後目翳丹方 用木賊草、擦取指甲末、同朱砂末等分、研勻以露水搜丸、芥子大、每以一粒點入目中甚效。

(二)用螺螄水煮常食可愈。

治痘後風眼丹方 用初生小兒臍帶血、乘熱點之、即愈。

治痘後生瘡丹方 用黃豆、燒黑研末、香油調塗、極爲神效。

治痘後癰毒丹方 用赤小豆、搗末、和雞子清、調勻敷之、即愈。或用赤豆、黑豆、綠豆等分爲末、醋調敷之、亦效。

辛編 皮膚病的丹方

治皮膚中痛丹方 用醋調燕窩泥敷之甚效。

(二)用胡椒、四錢、研末、好燒酒、四兩、煮滾、以布蘸酒、乘熱擦之。

(三)用杏仁、炒黑研如泥、敷之即愈。

治皮厚如鐵丹方 用苦參、二錢、酒煎服。外以苦參研末、酒調敷之、久熱自愈。

治皮枯如鱗丹方 用牛骨髓、同蘇合油、煎炒空心熱酒服一盃、半月全愈。

治遍身搔癢丹方 用荊芥、防風、各一錢、赤芍、銀花、生地、各八分、木通、五分、甘草、三分、水煎服、極效。

(二)用白花益母草、煮湯洗浴、數次即止。

(三)用生車前子、研末、水調搽之、可愈。

(四)用楓子肉、蛇牀子、各五錢、枯礬、點銅錫、各一錢、共爲末、加水銀二錢、和生豬油、搥融搽之、雖極癢難熬、抓破見血者、此方極妙。

治風濕疹子丹方 用牛膝爲末、酒服一匙、日三服、自愈。

(二)用枳殼三兩、麩炒爲末、每服二錢、水一盞、煎六分、去滓溫服、以汁搽之。

治癩子痒痛丹方 用苦參四兩、大菖蒲二兩、河水煮沸湯洗浴、臨洗加雄豬胆汁四五枚、洗後避風甚效。

(二)用滑石五錢、菉豆四兩、炒研成粉、和勻以棉撲之。

治腋下狐臭丹方 用礬石末、絹袋盛之、常挾腋下甚妙。

(二)用雞子兩枚。煮熟去壳。熱夾腋下。待冷棄之。三叉路上。勿回顧。如此三次甚效。

治滿體生斑丹方 用元參、麥冬、各一兩。白芥子、沙參、各三錢。升麻、二錢。白芷、一錢。丹皮、五錢。水煎服。

連服三劑。盡消。

治點痣立去丹方 用糯米一粒。浸濃鹼水中。俟柔軟後。挑取少許點之。不可太多。恐傷好肉。

治豎頭肉粒丹方 用紅菱柄。擦之。即永不復生矣。

治患紫癰風丹方 用硫黃、輕粉、蜜蛇僧、斑蝥、製存性。樟腦、各等分。共研極細末。俟出汗時。以生薑、蘸

擦患處。二三日洗去。即可除根。

(二)用蜜蛇僧爲末。黃瓜蒂蘸擦之。甚效。

治患口癰風丹方 用白鱸魚。晒乾。煎枯。取油。擦之。即愈。

(二)用桑柴灰。二斗。甑內蒸之。取釜內熱湯洗。不過五六次。即瘡。

(三)用小麥。攤石上。燒鐵器壓出油。擦之。久擦自愈。

治患鵝掌風丹方 用大碗一只。以紙緊糊碗口。紙上針刺多孔。上鋪細米糠。二三寸厚。手箝燃炭放

糠上緩緩燒之。燒至離紙三分光景。將炭與糠一并棄去。取碗中糠油。時時搽之。數日斷根。永不復發。

治患鶴膝風丹方 用大何首烏煎酒服。以醉爲度。更搗渣敷膝頭。數次可愈。

治頭面生癬丹方 用新鮮皂角刺一二斤。搗爛熬至將成膏時。加好醋熬成稠。將癬剝破敷上。日割日敷。自有毒水流出。流盡再敷十日。無不斷根。

(一)用荔枝核磨醋將癬抓破搽之。數日即愈。再發再搽。

(二)用青礬炒成塊。研細末。加猪胆汁和融。再炒再研。以老薑一塊切開蘸藥搽之。大痛即愈。

治多年頑癬丹方 用羊蹄根杵絞汁。入輕粉少許。和如膏塗之。三五次即愈。

(一)用斑蝥七個。醋浸露一夜。搽之亦愈。

治牛皮頑癬丹方 用生驢皮一塊。以朴硝醃過炙灰。麻油調搽即愈。

(二)用牛蹄甲驢糞各一兩。燒存性研末。油調抓破敷之。五七日自愈。

(三)用黃牛皮一塊。炙灰存性。以醋調敷患處。數次即瘥。

治荷葉癬瘡丹方 用乾荷葉蒂研末以香油調敷數次即效。

(二)用槿樹皮浸汁磨雄黃敷之甚效。

治梅花癬瘡丹方 用麻油一杯以小竹燒火入內煎沸加豬胆汁一個和勻剃頭擦之勿令日晒。二三日即愈。

治患蛙髮癬丹方 用生薑切塊浸火油內浸透取出擦頭皮患處即愈。

治五種疥瘡丹方 此方無論乾疥、溼疥、蟲疥、灰疥、膿疥、五種皆治。用胡桃肉、紅棗肉各一兩、水銀五分、冰片三分、真小蘇油、豬油各四錢共搗融以粗夏布包藥擦之擦過即止癢止痛數日即愈。

(二)用整塊硫黃於銅器內燒燃存性倒在地上海冷研爲細末加水銀、麻油拌勻以布包好烘熱時擦之二日即愈。

(三)用流動蘇合香二分、阿列布油二錢溶和塗之甚效。

治翻花惡瘡丹方 用鼠尾草根切碎同豬油搗融敷之即愈。

治熱瘡作痛丹方 用男子尿桶中白霜敷之清涼止痛乾則再敷甚效。

丹方一千種

治凍瘡未潰丹方 用蘿蔔、橘皮煎湯洗之。

(二) 用朴硝一二錢。泡湯乘熱洗之。甚效。

(三) 用樟腦一錢。石油一兩。塗擦腫處。即消。

(四) 用沃度丁機一錢。酒精二錢。搽擦甚妙。

治凍瘡已潰丹方 用橄欖核燒存性。研細末。加輕粉少許。香油調搽。神效。

(二) 用蟹壳燒灰研末。麻油調敷。

(三) 用亞鉛華五分。及單軟膏五分。塗之。其效如神。

治漆瘡腫爛丹方 用杉木屑煎水洗。再以活螃蟹黃、滑石和蜜調敷。甚效。

(二) 用貫衆焙枯研末。香油調敷。

(三) 用銀杏樹葉煎水洗之。即消。三次全愈。

(四) 用新荷葉煎水洗之。亦極神效。

治漆瘡作痒丹方 用馬牙消泡湯洗之。甚效。

(二)用白礬末泡濃湯拭之乃止。

治腿面腫瘡丹方 因溼熱而起。生於小腿上面。又被手甲風毒傷。破爛淋漓。纏綿不已。欲求速愈。切忌手搔。自易痊也。初起者用濃茶洗淨。再以好乾茶葉嚼融敷之。

(二)用木耳瓦上焙枯研末敷之亦效。

(三)用樟腦三錢。銅綠一錢。以猪板油和藥搗爛。以油紙夾之。貼患處。一二日翻轉貼。三四日膿盡而愈。

治生坐板瘡丹方 用莞花、川椒、黃柏各等分。煎水洗。初起即消。

(二)用馬齒莧搗爛取汁。敷膏敷之即愈。

(三)用生脂麻嚼融敷之亦愈。

治生對口瘡丹方 生後頸正中處。偏生者名偏對口。用嫩桃葉尖不拘多少。以鐵斧搗融。初起貼之即愈。

(二)用明雄二錢。吳茱萸一兩。爲末。香油熬熟。調搽敷瘡立愈。

(三)用爛漚難矢數十數次即愈。加荔枝核研末調敷。尤爲神效。

治生人面瘡丹方 生在兩膝。或生在兩手彎者。眼口能動能食。用川貝母一味。研末敷之神效。

(二)用雷丸三錢。輕粉、茯苓各一錢。共爲細末。敷上即愈。

治生羊鬚瘡丹方 用小紅棗燒存性。研末。蘇油調敷。甚效。

(二)用舊棉絮胎。燒灰。清油調擦立愈。

治生天泡瘡丹方 用蓮蓬壳燒枯研末。取井泥調敷。神效。

治生黃水瘡丹方 用蛤粉煨一兩。真青黛三錢。熟石膏二兩。輕粉、黃柏各五錢。共研細末。先將香油

調和。再以涼水調稀塗之。神驗。

(二)用蠶豆壳瓦上焙枯爲末。入黃丹少許。以真菜油調敷。乾則再敷。三日即愈。

治生蛇形瘡丹方 用雄黃爲末。麻油調敷。再以雄黃末冲酒調服即愈。

治發背立愈丹方 此症乃癰疽中大患。若誤服寒涼藥。誤貼涼膏。定然毒攻內腑不救。宜用瓜萐五

枚。取子去壳。真乳香五枚。共研細末。以白蜜一斤。同熬成膏。每服三錢。溫黃酒化下。

(二)用生草決明一升。搗碎。生甘草一兩。水三升。煮一升。分二服飲之。初起服之神效。

(三)用雞內金同棉絮焙末。擦之即愈。已潰者敷之頗驗。

治腸癰立愈丹方 此癰有生于腸內者。腹內脹急。大小便牽痛如淋。潰後則膿從大便而出。有生于腸外者。肚臍腫痛作脹。或一足彎曲。口有臭氣。或膿自臍中出。甚則腸穿有虫自臍出。勢難爲計。初起宜用伏雞矢白。水和服。即瘥。

(二)用馬牙齒燒灰。鷄子白調和塗之。

(三)用單葉紅蜀葵根白芷各一兩。白枯礬白芍各五錢。爲末。黃臘溶化和丸。梧子大。每空心米飲下。二十九。待膿血出盡自愈。

治臍癰立愈丹方 肚臍腫脹突出。而不熱不紅者。以陰疽各方治之。紅赤熱甚者。以癰毒各方治之。立愈。

治懸癰立愈丹方 生於海底。初起細粒。漸大如桃李。俗稱儉囊老鼠。潰爛之後。一經房事走漏。即成漏生管矣。未成膿者。用生甘草熟大黃各三錢。酒煎空心服。一劑即愈。

丹方一千種

一一六

治擔肩癰癤丹方 此惟擔夫有之。用五倍子燒存性爲末。加黃丹水飛過。醋調敷之。極效。

治膝上生癰丹方 用連鬚葱頭切碎。糯米飯乘熱拌敷。重者五六次必消。

治肋下生瘡丹方 此名淵疽。生於肋下。久則有聲如嬰兒啼哭。百藥難效。惟用隔蒜灸法。在兩小腿陽陵泉穴。在膝下外邊一寸。以腿縮攏有一窩卽是。各燒七下。或十四下卽愈。

治石疽立愈丹方 初起一核。漸大如拳。堅硬如石。用赤小豆五合。納苦酒中五宿。炒研成末。以苦酒和塗卽消。

(二)用商陸根搗爛。加食鹽少許敷之。

治生脫骨疽丹方 此症生手足各指及指頭或生指節指縫。初起或白色痛極。或如粟米起一黃泡。其皮或如煮熟紅棗。黑色不退。久則潰爛節節脫落。延至手足背腐爛黑陷。痛不可忍者。用大甘草研極細末。以香麻油調敷極厚。每日一換。不可間斷。忌食發物。不出旬日必愈。再用金銀花元參各三兩。當歸二兩。甘草一兩。水煎服一連十劑。永無後患。藥味不可減少。減則不效。

治生多骨疽丹方 瘡中不時出細骨者是。用牛膝末酒服一匙。一日三服。自愈。

(二)用螻蛄腦炙枯不拘多少和灰麵敷入孔內次日自有骨出骨盡自愈。

治流注立愈丹方 發無定處如塊如核漫腫無頭皮色不變或痛或不痛久則破而流者是也。用久陳奶奶草洗淨二三莖與針刺七孔之雞蛋一個和水煮之俟蛋煮熟透時去渣與湯只吃蛋一二次日即愈。或用露蜂房一個愈大愈好大者力更大和雞蛋一枚以水煮之煮至濃厚時去蜂巢取蛋和湯飲之此方無論初起已潰有膿無膿服二三次即可止痛收口立有起色極為神效。

治惡核立愈丹方 大者爲惡核小者卽是痰核初起與石疽相同毒根最深却不易潰未潰時忌貼涼膏忌服涼藥用大田螺搗敷之內服陽和湯犀黃丸可消大忌開刀。

治失榮立愈丹方 此患多生肩甲以上初起微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動其症與石疽相同急照石疽各方治之可愈。

治瘰癧立愈丹方 初起者用頂好陳醋熬至滴水成珠加生半夏末一錢調勻敷之過夜再換兩日即消神效。

(二)用夏枯草金銀花蒲公英各五錢酒水煎時時常茶服之。

(三)用元參(蒸)牡蠣(煨酒炒)貝母(去心蒸)各四兩。共爲末。煉蜜爲丸。每服三錢。開水下。日二服。卽消。

(四)已潰者。用荊芥一味。要近根下一段。剪碎煎湯。溫洗良久。看爛處紫黑。針刺去血。再洗三四次。用樟腦雄黃等分爲末。麻油調敷。敷上出水。次日再洗再敷。以愈爲度。凡癰癰延至胸前腋下及二肩頸項。不能轉動。四五年不愈者。皆治。其效如神。

治鼠癰立愈丹方。瘡口已合。旁有眼出膿不止者是。又有頸項生之不已。復從脚底而生。俗謂鼠子打洞。其症尤惡。用老鼠一頭。去毛搗爛。亂髮一團。另以火腿肥肉煎出油。入鼠髮二物。煎至消盡爲度。以一半敷瘡眼。一半酒冲服。有效。

(二)用白蘚皮。煮汁。服一二碗。當吐惡物如鼠子。雖已破出膿。亦效。

治生九子瘍丹方。生頸上一連九個者。是用蕎麥炒去殼。海藻白殭蠶炒去絲。等分爲末。白梅浸湯取肉。減半和丸綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥米飲下。日五服。其毒從大便泄去。若與淡菜連服。尤好。忌豆腐雞羊酒麪發物。久服全愈。

治疔瘡初起丹方 初起如粟大。或大小不一。如發寒熱。及麻癢嘔吐。卽於遍身留心尋認。一日須看數次。如尋得疔瘡所在。急宜刺出惡血。見好血爲止。用真菜油。或真蘇油。服之。或用白菊花葉。連根搗汁一茶盃。滾水和服。毒重者宜多服。渣敷患處。留頭不敷。蓋被睡臥出汗。其毒自散。

(二)用烟桿中烟油。厚敷四圍。留頭不敷。少頃疔破出水而愈。奇效。

治紅絲疔瘡丹方 急用紫花地丁一兩。白礬甘草各三錢。銀花三兩。煎服立愈。

(二)用烟桿中烟油。離絲三分處敷之。絲卽不走。

治刀鐮疔瘡丹方 形如韭菜。寬長一二寸。肉色紫黑者是。忌用針刺。用明礬三錢。爲末。葱白七個。二味研爛。分作七份。每份以熱酒一盃送下。服完蓋被取汗。如無汗再以葱頭湯催之。少頃汗出便佳。再以溇雞屎塗之。卽愈。遲則毒入心腑致命。

治羊毛疔瘡丹方 初起頭痛。身發寒熱。前坎後背心有紅點如疹子形。先用針挑破取出羊毛。再以明雄末二錢。青布包墊。蘸熱酒於前心坎瘡上一二寸外。四圍團團擦之。漸漸擦出瘡眼。其毛卽奔至後背。仍照煎法擦之。其羊毛俱挾在布上。卽埋入土中。然後用紫花地丁一兩。白礬甘草各三錢。

丹方一千種

1110

銀花三兩煎服之。

治頭面諸疔丹方 用紫花地丁、金銀花各一兩、白果二十個、桔梗、生甘草、知母各三錢。水煎服。至重

三劑必愈。

治疔瘡惡腫丹方 用曲頭棘刺三百枚、陳皮二兩、水五盞。煎一碗半。分服。

(二)用九月九日采芙蓉葉。陰乾爲末。每以井水調貼。次日用蝸牛一個搗塗之。

治疔瘡黑回丹方 用常春藤搗汁和蜜一盞服。外以葱蜜搗融塗敷四圍可愈。

治疔瘡出血丹方 用真小磨蘇油一大碗。飲之立止。或飲真菜油更佳。

治疔瘡走黃丹方 用芭蕉根搗自然汁服之。立可回生。

治癰瘤初起丹方 用海帶、海藻、昆布、海蛤、海螵蛸各五錢。煎湯當茶飲。甚效。

(二)用川黃柏、海藻各一兩。共爲細末。每用五分。放手心上。以舌舐之。一日五次。卽消。

(三)用石榴樹上寄生。醋磨擦之。極效。

(四)用櫻桃核好醋磨敷。卽消。

治肉瘤立愈丹方 凡初起肉瘤如小彈子者。每夜將睡時。用新熟熱飯。敷上。冷則另換。每晚連敷三次。久而自愈甚效。

治血瘤立愈丹方 用甘草熬膏。以筆蘸圈瘤四圍。再以芫花大戟甘遂等分爲末。醋調。另以新筆蘸塗於甘草圈內。務須離開甘草圈。不可太近。因藥性相反。切勿誤相攪和。塗後次日瘤常縮小。再如前法塗三四次。即愈。

治粉瘤立愈丹方 用天花粉一兩。陳壁土五錢。穿山甲川貝母去心各三錢。共爲末。和勻。搽無藥膏藥上。貼之即穿。出粉渣而愈。

治漏瘤立愈丹方 時出黃水。好而復發。癢不可忍者。用羊蹄根。搗和醋。患處洗淨。塗上一小時。以冷水洗之。日塗一次。即愈。

治虱瘤立愈丹方 此瘤其癢徹骨。破開有虱無數。內有極大一虱。用針挑盡。外貼玉紅膏自愈。

治髮瘤立愈丹方 此瘤多生耳後。髮下寸許。按之不痛。用針刺破。擠盡粉髮。再以生肌藥敷之。自愈。

治腋下癭瘤丹方 用長柄壺盧一個。燒枯存性。研爲細末。麻油調敷。以消爲度。

丹方一千種

一二二

治鼠形癰瘡丹方 用苦參二斤。露蜂房二兩。麴二斤。水二斗。浸二宿。去滓入黍米二升。釀熟稍飲。每

日三次。久服自愈。

(二)用通草浸酒。日日飲之。

治蛇形癰瘡丹方 用蛇腹中蛙。燒灰封之。

治蜣螂癰瘡丹方 用熟牛糞。封之。日數易。當有蜣螂出。

治蝦蟆癰瘡丹方 五月端午日。尋取蛇頭。同野豬脂。封之。極效。

壬編 花柳病的丹方

治睡後遺精丹方 用白龍骨四分。韭菜子五合。爲末。空心酒服一匙。卽愈。

治內熱遺精丹方 用鐵鑪研爲細末。以冷水調服一錢。三服有效。

治腎虛遺精丹方 用五味子一斤。洗淨水浸。按去核。再以水洗核。取盡餘味。通置砂鍋中。布濾過。入

好冬蜜二斤。炭火慢熬成膏。瓶收五日。出去火性。每空心服一二茶匙。百滾湯冲服。一料全愈。

治心虛遺精丹方 用猪心一個。批片相連。將飛過硃砂末。摻入。用綫縛緊。煮熟食之。心甯精固矣。

治虛遺滑精丹方 用砂仁一兩。白茯苓二兩。研末。加鹽二錢。將精羊肉批片。拌藥末炙食。以酒送下。

自愈。

治驚悸遺精丹方 用木蓮（俗名鬼饅頭）白牽牛等分爲末。每服二錢。以米飲湯調服。

治夢中遺精丹方 用紫蘇子一升。熬杵研末。酒服一匙。日服二次。數日即愈。

治心虛夢遺丹方 用白茯苓爲末二錢。以米飲湯調下。日服二次。甚效。

治陰虛夢遺丹方 用鼈甲炙研。每用一錢。以酒半盞。童便半盞。葱白七寸。同煎。去葱。日暮時服之。出

臭汗爲度。

治勞心夢遺丹方 用龍骨、遠志等分爲末。煉蜜丸如梧子大。硃砂爲衣。每服三十九。蓮子湯下。

治小便赤濁丹方 用益智仁、茯神各二兩。遠志、甘草水煮。各半斤爲末。酒糊丸。桐子大。空心薑湯下。

五十九。

治小便白濁丹方 用糯米五升。炒赤黑。白芷一兩。爲末。糯粉糊丸。梧子大。每服五十九。以鬼饅頭煎

湯下。

丹方一千種

一一四

(二)用楮葉爲末。蒸餅丸梧子大。每服三十丸。開水下。

(三)用野芝、蘇、炒黑研末。以酒冲服。甚效。

治腎虛白濁丹方

用五味子一兩。砂研末。好醋糊丸。桐子大。每服醋湯下三十丸。男效。

治脾虛白濁丹方

用羊脰骨、炙灰一兩。姜製厚朴。研末二兩。麵糊丸。桐子大。米湯下百丸。早晚各服

一次。

治氣虛白濁丹方

用白茯苓一兩。黃芪、鹽炒五錢。共爲末。每服一錢。白開水送下。半月全愈。

治虛勞白濁丹方

用羊骨、搗末。酒服一小匙。日服三次。有效。

治濕痰白濁丹方

用牡荊子炒爲末。每服二錢。陳酒送下。

治小便如泔丹方

用兔絲子酒浸二兩。白石脂二兩。土瓜根、桂心、牡蠣各一兩。共爲末。每服二錢。以

粥飲湯調服。

治小便如膏丹方

用苦楝子、小茴香等分炒爲末。每食前酒服二錢。

治小便尿血丹方

用旱蓮草、車前草各等分。搗取汁。每晨空心服三杯。不久自愈。

(二)用五倍子爲末。鹽湯和丸。梧子大。每空心酒服五十九。卽止。

(三)用琥珀末。燈芯煎湯。調服二錢。甚效。

(四)用頭髮燒灰。每服二錢。醋湯送下。亦愈。

(五)用人指甲半錢。頭髮錢半。燒研末。每服一錢。空心溫酒下。

治小便血條丹方 用淡豆豉五錢。煎湯空心酒服。

治心熱尿赤丹方 用木通、生地、炙甘草等分。加竹葉七片。水煎服。

治勞傷溺血丹方 用茅根、乾薑等分。入蜜一匙。水二鍾。煎一鍾。每日一服。數服卽清。

治卒淋不通丹方 用紫草一兩。爲末。每食前用井華水服二錢。

(二)用地膚草。搗自然汁服之。卽通。

(三)用大麥三兩。煎湯入薑汁、蜂蜜少許。代茶飲之。甚效。

治小便石淋丹方 小腹急脹。莖內痛如刀割。尿如沙石者。用銀硝炒焦研細。溫水沖化。每服二錢。加

滑石二錢。水調服。神效無比。

丹方一千種

一二六

(二)用生葱頭、同生鹽、搗融、敷臍上、其砂自出。

(三)用牛角、燒灰、酒服二錢、日服五錢、亦效。

(四)用胡桃肉、煮粥、多食甚效。

治小便氣淋丹方 小腹急滿、欲解不出、解後常有點滴者、用甘蔗上青草梢、一兩、酒煮服、三日全愈。

(二)用白芷、醋浸焙乾、二兩爲末、煎木通、甘草酒調下一錢、連進二服、卽愈。

(三)用絲綿、四兩、燒灰、麝香五厘、每服二錢、溫葱酒下、連進三服、自通。

治小便熱淋丹方 小便熱而赤、短而澀、臍下急痛者、用滑石六錢、甘草末一錢、水沖服、日服數次、三

日卽愈。

(二)用白茅根、四升、水一斗五升、煮取五升、適冷暖飲之、日三服、甚效。

(三)用大小薊根、搗爛絞汁、服之自愈。

(四)用海金沙、陰乾爲末、煎生甘草湯、調服二錢、神驗。

治小便勞淋丹方 勞傷虛損、小便不通、小腹疼痛、尿出白汁一點一滴者、用牛膝一兩、乳香一錢、酒

煮溫服。連服數次。其效如神。

(二)用五倍子一斤。白茯苓四兩。龍骨二兩。爲末。水糊丸。梧子大。每服七十九。食前鹽湯送下。一日三服。數劑自愈。

治小便血淋丹方 小便內有血點。或血條者。用浮小麥。加童便炒。研細末。以沙糖調服五錢。一服即愈。

(一)用生藕節搗爛。以酒沖服。亦效。

(二)用尖檳榔煎濃汁。加白蜜調服。

治老年病淋丹方 用綠豆二升。橘皮二兩。煮豆粥。下麻子汁一升。空心漸食之。並飲其汁。甚驗。

(二)用小麥一升。通草二兩。水三碗。煮一碗。飲之即愈。

治梅毒立愈丹方 用大黃一兩。穿山甲(炒)厚朴白芷大楓子仁花椒甘草各三錢。水煎兌酒服。毒氣從大便出。七日全愈。

(二)用紅棗三斤。以杉木作柴。煮之。煮熟剝皮去核。多取燒過杉木枯灰磨細末。和棗肉搗勻爲丸。如

丹方一千種

一二八

彈子大。每日任意食之。不可間斷。雖瘡毒滿身。服過輕粉。穿頂穿鼻。潰爛不愈者。服之大有奇效。

(三)用生甘草、金銀花、蒼朮、白芷、藿香、槐花各二錢。共煎水洗之。

治下疳立愈丹方 用五倍子研末。絲瓜搗爛包敷。神效。

(二)用鼈甲燒灰敷之。百藥不效者。用此如神。

(三)用甘草、銀草、蔥頭煎湯洗淨。然後再以生橄欖核一個燒存性。入真梅片一分。共爲細末。麻油調塗敷之。即愈。

治橫痃立愈丹方 用皂角刺六錢。研末。布袋裝好。同糯米二合煮粥。每日時時服之。三四日全消。

(二)用五倍子新瓦上焙乾研末。好陳醋調勻攤布上貼之。布上加紙一層。過夜即消。雖潰爛久不收口。貼此亦效。

(三)用製甘遂乾大戟(炒)白芥子各等分。爲末。煉蜜爲丸。梧子大。每服三分。日服三次。全愈乃止。

治魚口立愈丹方 用白礬燒枯研末。以寒食麪糊調敷之。即消。

(二)用五倍子不拘多少。以淨瓦器盛之。加陳醋熬成膏。棉布攤貼。如乾即換。三五次即愈。

治患腎囊風丹方 用包鹽蒲包一塊。週圍約一二尺。熬水洗之。洗畢將水留存。炖熱再洗。一日數次。三日即愈。

(一)用茄子一枚。連根葉煎湯薰洗。一周時脫壳如初。其效。

(二)用新荷葉一張。連鬚葱白七個。煎湯先薰後洗。屢試神驗。

治瘰癧丸生癰丹方 用枸橘一全個。川棟。秦艽。陳皮。赤芍。甘草。防風。澤瀉。各一錢半。初起一服即愈。

治陰囊濕痒丹方 用枯礬。泡湯洗之。再以枯礬爲細末。撲之。

(一)用綿黃耆酒炒爲末。以煮熟豬心蘸喫之。自愈。

(二)用石膏。蒲蛇。牀子。等分爲末。日搽二三次。即愈。

治陽痿不振丹方 用蛇床子。五味子。兔絲子。等分爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。日服三次。

(一)用鯉魚膽。雄雞膽。各一枚。爲末。雀卵和丸。小豆大。每吞一丸。

(二)用覆盆子。酒浸焙研爲末。每旦酒服三錢。

治腎虛陽痿丹方 用雀卵。和天雄。兔絲子末。爲丸。空心酒下五丸。

丹方一千種

1110

治腎滯漏疾丹方 用補骨脂、韭子各一兩爲末。每服三錢。水二碗煎六分。日服三次。不久自愈。

治精脫欲絕丹方 男女房事舉極。脫精欲絕者。切不可驚走下床。男脫則女以口哺送其熱氣。女脫

則男以口哺送其熱氣。乃用人工呼吸法。則必悠悠然陽氣重回。急煎人參附子湯灌之。若一時不能得參。急用黃芪四兩。當歸二兩。附子五錢。水煎服可活。

治陽物縮入丹方 用火藥二錢。研碎滾水沖服。以熱酒更妙。如能吐瀉即可回生。若不用此猛烈之藥。決無生理。勿以危險忽之。

治陰毛生虱丹方 用百部末。好燒酒。飯鍋上炖熱擦之。頗效。

癸編 急救病的丹方

治三絕猝死丹方 急用韭菜搗汁。灌鼻中。或加皂角末。麝香同灌。更爲快捷。

治痰厥猝死丹方 急用生半夏末。如豆大。吹兩鼻孔中。吐出痰血立愈。

治氣厥猝死丹方 閉目不語。如中風狀者。用南木香爲末。冬瓜子煎湯灌下三錢。痰盛者加竹瀝薑

汁尤妙。

治尸厥猝死丹方 急痛醫其踵及足拇趾甲際。睡其面卽甦。以菖蒲末吹鼻中。桂末納舌下。并以菖

蒲根搗汁灌之。

(二)用白馬前脚夜眼二枚。白馬尾十四莖。合燒以苦酒。丸如小豆大。白湯灌下二丸。須臾再服卽甦。

治暴厥猝死丹方 急用皂角末吹鼻。得噴嚏卽醒。如倉卒無藥。急於人中穴及兩足大拇趾離甲一韭葉許。各用艾火灸三五次卽活。

治睡魔猝死丹方 不得用燈火照。並不得近前急喚。用生半夏末約一豆大。吹人兩鼻。取母雞冠血搽面上。乾則再搽。無有不醒。

(二)用樟木燒烟熏之亦醒。

治睡中行走丹方 床前釘白鐵一方。則其人起立時足踏白鐵。過冷而醒矣。

治縊死急救丹方 心口猶溫者勿斷繩。急刺雞冠血滴口中。以安心神。男用雌鷄。女用雄雞。

(二)用生鹽炒熱。分爲兩包。從頸喉熨至臍下。冷則換熱。不可住手。並用人工呼吸法。無有不活。

治溺死急救丹方 用大橈臥之。後足放高。以鹽擦臍中。待水自流出。切勿倒提出水。

丹方一千種

11111

(二)用鴨血灌之。卽活。終身戒食鵝鴨。

治凍死急救丹方。凍死四肢直。口噤有微氣者。用生半夏末。如豆大。少許入耳鼻內。又用大鍋炒灰布包熨心腹上。冷則換之。候目開。以溫酒及清粥少少與之。不可太熱。恐傷齒盡落。如已救活。用生薑、陳皮共搗碎各等分。以水三碗煎一碗溫服。

(二)用雄黃、礞石等分爲末。點兩眼內角可甦。

治跌死急救丹方。急扶起盤脚坐地。以手提其髮。將生半夏末約豆大吹入鼻中。取生薑汁灌下。祇要心頭微溫。雖至一日亦活。再用白糖調水與服。散其瘀血。加童便灌之。最妙。

(二)從高墜下欲死者。用老鴉眼睛草。莖葉搗汁服。以渣傳患處甚效。

(三)用琥珀屑酒服方寸匕。或入蒲黃三二匕。日服四五次。散其瘀血也。

治壓死急救丹方。治法同跌死急救。

治打死急救丹方。用松節搥碎一二升。入鐵鍋內炒起青烟爲度。以老黃酒二三升四圍沖入。卽溫淨。候半熱開牙關灌入。卽活。

治驚死急救丹方 用溫酒一二杯灌之即醒。

治雷擊急救丹方 用蚯蚓搗爛敷於臍上。半日可活。

治自刎急救丹方 急宜早救。遲則額冷氣絕。乘初刎時。輕輕扶住。使仰臥。將頭墊起。合攏刀口。將血拭去。用大雄雞一只。快手輕去其毛。活剝其皮。乘熱貼傷口。布裹完好。安穩枕臥。自然蘇醒。再行調理全愈。

治觸電急救丹方 將患者速臥潮潤地上。以泥沙滿蓋其全身。留口鼻使其呼吸。電自收去。

治吞金急救丹方 用羊脛骨燒枯爲末。米湯調服二三錢。一日必出。

(二)用糯米糖食半斤亦效。

(三)橄欖核燒枯研末。開水調服。自出神效。

治鴉片急救丹方 吞烟以自盡者。往往有之。或將死而未死。只要撬開牙關。灌得下藥。急用明雄黃二錢。雞蛋清二枚。生桐油一兩。若和燒酒吞下者。加葛花三錢。炒黃爲末。各味均用河水調和灌下。即吐。如未和燒酒吞食者。不用葛花。或所吐之烟未盡。或不肯速吐。可用硬鴨毛。或硬雞毛蘸桐油。

掃咽喉。必令其烟毒吐盡。然後進以稀粥。則胃氣未安。食下又必作吐。再吐之後。卽用生甘草五錢。食鹽五分。明礬五分。金銀花五錢。土茯苓五錢。煎湯服之。以追餘毒。愈後多食柿餅。解去桐油之毒。治火柴急救丹方。急用生雞蛋白。傾入服毒者口中。尤多尤妙。蓋蛋白涼滑絲膩。火柴頭被蛋白裹住。不能發展炎毒。再用膽礬五厘。溶化於河水一茶杯中。每五分鐘服一次。連服四五次。必將蛋白和火柴頭盡情傾吐而愈。

治中煤氣毒丹方。火爐內投紅棗數枚。能解煤毒。若已中毒氣者。速移至清涼空氣中。令仰臥地上。澆冷水於面。以洗之。並用人工呼吸法。可救。

治中鎰水毒丹方。急用肥皂水。或蘇打水。皆可解救。如一時無此二物。卽用刀將壁上石灰刮下一二酒盃。沖水一大碗服之。可保無恙。

治中鹽鹵毒丹方。用生豆腐漿。冷服二三碗。至神至妙。如一時難得。以黃豆搗爛沖冷水。去渣服之。

(一) 用淘米泔水。冷服三四碗。亦解。

(二) 用白沙糖五六兩。冷水調服。亦極效驗。

治中鹼水毒丹方 用活鵝鴨血多多灌之。卽解。或照中鹽瀆毒各方治之。

治中桐油毒丹方 急用熱酒飲之卽解。

(一)用蓮蓬煎水服之甚效。

(二)用真乾柿餅食之亦解。

治中砒霜毒丹方 用防風一兩。研末。冷水調服。或用四兩。冷水搗汁。灌服亦可。屢試如神。

治中水銀毒丹方 用真川椒數斤。妙熱鋪蓆下。令患者脫淨衣服。蓋被睡之。過一夜。水銀從毛孔中。

鑽入川椒內矣。

治中鉛粉毒丹方 用白沙糖三四兩。冷水調服。或用蘿蔔搥汁灌之。均極效驗。

治中輕粉毒丹方 口齒腫爛。或筋骨疼痛。羣宿者。用土茯苓一兩。苡米。銀花。防風。木通。白蘚皮。各一。

錢。木瓜。錢半。皂莢子四分。氣虛加黨參一錢。血虛加當歸七分。煎服。日服三次。忌服茶。並牛羊雞鵝。

魚肉。燒酒。麪食。辣椒。海鮮。及一切發物。戒房事半年。服至十日。漸次全愈。功效異常。

治中硫磺毒丹方 用防已二錢。煎水。冷服卽解。

丹方一千種

三三六

(二)用黑鉛二兩煎湯服之可解。

治中硃砂毒丹方 用藍錠韭汁飲之即解。

治中冰片毒丹方 服冰片過多口渴心煩者用地漿一碗冷服可解。

治中巴豆毒丹方 用甘草一二兩黑豆一升煮汁冷飲即解。

治中斑貓毒丹方 用冷水調六一散七錢服二三次必痛止而愈。

(二)用玉簪花根煎水冷服即解。

治中木鱉毒丹方 身發抖戰者是用香油一盞和白沙糖一兩灌之生效。

(二)用上好肉桂二錢煎服即愈。

治中花椒毒丹方 口吐白沫身冷氣欲絕者是用巴牆草搗爛煎湯冷服。

治中杏仁毒丹方 用杏樹根皮煮湯飲之雖迷亂將死者皆可救。

(二)用麝香一分冲水服亦效。

治中木瓜毒丹方 舌脹大滿口者是急用好醋調黃糖含口中吐出涎水數次立愈。

治中木耳毒丹方 用冬瓜簾搗爛絞汁服之即解。

治中野葛毒丹方 用白鴨殺取自然熱血對口急急灌入即活。不可灌遲。遲則血冷恐難見功。

治中野菌毒丹方 用防風煎湯飲之可解。

(二)用芫花生研新汲水服一錢以利爲度。

治斷腸草毒丹方 用活羊血灌一二碗即活。

(二)用蘇棗搗汁灌之其效如神。

治水蓑蓉毒丹方 比草葉圓而光誤食發狂狀如中風。或作嘔吐者用甘草煮汁冷服可解。

治中雞肉毒丹方 用地漿水飲之可解。

治中野鷄毒丹方 吐泄不止者用生犀角末三分冷水調服即解。

治中鵝鴨毒丹方 用糯米半斤淘水去米溫服一碗自愈。

治中豬肝毒丹方 用熟豬油一斤拌飯或炒飲分作一二日食盡一二日內勿食別物即解。

治中牛肉毒丹方 用苦瓜皮搗爛沖水服甚效。

丹方一千種

(一)用菊花連根搗汁。酒服可解。

治中馬肉毒丹方 用人乳飲之即解。

治中甲魚毒丹方 用冷水調鹽飲之可解。

(二)用淡豆豉一合。搥爛以冷水冲入。取汁服之即愈。

治中螃蟹毒丹方 用柴蘇或子養六汁。冷服二三碗即解。

(二)用生藕汁或生大蒜汁生冬瓜汁生黑汁均可解。

治中河豚毒丹方 用青橄欖搗汁。或將橄欖核磨水服甚效。

(二)用真蘇油一二杯飲之亦效。

治中鰻魚毒丹方 用生螃蟹搗融冲冷水飲之有效。

治中諸蛇毒丹方 用旱烟桿中或水烟袋中烟油以冷水洗出二三碗飲之神驗。

(二)用明雄黃末調水冷服亦效。

治中蜘蛛毒丹方 用藁耳草搗汁一盞服之外以其渣敷之。

治中蚯蚓毒丹方 用鹽湯或石灰湯時時洗之。

治中蜈蚣毒丹方 用樟樹葉煎水冷服極效。

治中蝦蟆毒丹方 用鹽齏汁飲之可解。或照中甲魚毒各方治之。

治誤吞金箔丹方 用羊血灌之最爲神效。

治誤吞銅錢丹方 用煉過白蜜一二碗服之可出。

(二)用葶藶搗汁飲之自然消化。

治誤吞鐵針丹方 用蠶、養、韭、菜同食針與菜從大便而出。

治誤吞鐵針丹方 用豬脂多食令飽自然裏出。

治誤吞鐵屑丹方 用炭皮研末調粥二三碗食之。炭末卽裹鐵屑從大便而出。

治誤吞竹木丹方 用鐵秤錘燒紅淬酒飲下有效。

治誤吞玻璃丹方 用赤豆煮湯爛熟儘量食之。食後再服瀉藥從大便而出。

治誤吞稻芒丹方 用飴糖多食有效。

丹方一千種

一四〇

治誤吞桐油丹方 用蓮蓬殼煎湯飲之甚效。

治誤吞昇汞丹方 昇汞乃西藥之最毒物。誤服立斃。速用生雞蛋白連服數個。隨大便而出。

治誤吞頭髮丹方 用舊木梳一個燒灰。用黃酒沖服。良效。

治誤吞耳屎丹方 用人中黃五分。黃連一錢。煎服可免聲啞。

治誤吞螞蝗丹方 用桂圓肉或荔枝肉包旱烟桿中之煙油吞之。螞蝗卽死。隨大便出矣。

(二)用羊肉食之。蝗化爲水無害。

治飲酒醉傷丹方 用鍋蓋上熱氣沖上之水半盞。灌下半時卽醒。

(二)用黑豆一升。煮汁。乘溫灌下三四盞卽產。

治鴉片醉傷丹方 用鹽水飲之解。或飲醬油或糖水均效。

治香烟醉傷丹方 用鹽橄欖滾水泡湯飲之可醒。

治水烟醉傷丹方 用胡黃連一錢。煎湯代茶味之卽醒。

治魚骨卡喉丹方 用橄欖核磨臈汁滾水調服卽愈。

(二)用貫衆、焙枯研末。每服一二錢。煎濃湯含口中。緩緩嚥下亦愈。

(三)用糯米糖爲丸。吞之卽下。

治雞骨卡喉丹方 用山查煎濃汁服之。卽化。

(二)用苧蘇根搗融爲丸。如桂圓大。以鷄湯吞下亦可。

治稻穀卡喉丹方 用鵝或鴨口涎灌之卽下。

(二)用紫花地丁細嚼吞之神效。

(三)用糯米糊食之亦下。

治諸豆卡喉丹方 用螻蛄數個搗爛敷喉外腫處。其豆自下。

治桃杏卡喉丹方 用狗頭煮湯服。並擦頭頂卽愈。

治竹葉卡喉丹方 急用牛口中涎以滾水對服。能化竹葉。

治竹木卡喉丹方 用老絲瓜燒灰。每服三錢。溫酒下。

治田螺卡喉丹方 用活鴨一隻。以水灌口。少頃將鴨倒弔取涎。與服自化。

治鐵針卡喉丹方 用癩蝦蟆數個。將頭剝去。倒垂流血。以碗接之。得一盃許。灌入喉中。少頃連針吹出矣。

治頭髮卡喉丹方 用亂髮燒灰。髮灰須令燒盡。不可留一絲生髮。水調一錢服之。即安。

治被湯火傷丹方 用生芋艿。搗融敷傷處。芋熱再換。數次立愈。即能止痛拔毒。雖極重者。亦不至潰爛。

(二)用蚯蚓或蜥蜴數條。加白糊拌。以碗蓋住。半日即化為水。搽之神效且速。

(三)用人乳和鹽敷之。止痛甚效。

治被人咬傷丹方 先用童便洗淨傷處。然後用荔枝核。焙研細。摻之以荔枝肉蓋貼。雖入水亦不爛。神效之極。

治被虎咬傷丹方 用樟樹皮葉嚼食。並將葉嚼融敷之。甚效。

(二)用韭菜白。搗汁飲之。渣敷傷處可愈。

治被狗咬傷丹方 用胡椒研細未敷之。雖不過數日收功。惟初敷必痛而且腫。少刻痛止腫消。

治被馬咬傷丹方 用豬肉、白糞一大片、同飯自嚼貼患處、立時止痛即愈。

(二) 用打馬鞭子、或攏頭索、燒灰摻之、即愈。

治被貓咬傷丹方 用薄荷油、搽之、即愈。

治被鼠咬傷丹方 用荔枝肉、嚼融敷之、甚效。

治被蛇咬傷丹方 如遇毒蛇咬傷、惡毒攻心、半日必死、急用竹木桿、煙筒內煙油、將冷水洗下、水飲

一二碗、多飲最佳、傷口痛生者、多用煙油搽擦、神效無匹。

治黃蜂咬傷丹方 用芋頭梗、搗融敷之、極效。

(二) 用青蒿、嚼爛敷之、即安。

(三) 用生麻油、搽之、甚妙。

治蟻咬傷丹方 咬人最毒、不治必死、急用白礬末、敷之、即愈。

(二) 用桑枝、燒枯、煎濃汁、調白礬末、敷之、亦效。

治壁虎咬傷丹方 用桑葉、煎濃汁、調白礬末、敷之。

丹方一千種

二四四

治蜈蚣咬傷丹方 用手指甲磨水敷之立愈如神。

治蠅蚋咬傷丹方 名曰多足虫以尿射人中其毒皮膚卽起燎漿泡痛極難熬急用棉花蘸熱鹽湯敷數次卽消。

治蚊蚋咬傷丹方 用絲瓜葉搗汁以太乙紫金錠磨水和之敷上卽效。

治晚蠶咬傷丹方 用家苧蘇葉搗漸塗之應手而愈。

治跌打損傷丹方 用野菊花連根陰乾每服一兩加酒與童便各一碗煎服但有一線之氣無不活者。

治跌壓傷重丹方 傷重者口耳出血昏暈不醒只要身體尙軟皆可救活切忌人多曹雜只令親人呼而扶之且就坐於地緊緊抱定曲其手足隨以熱童便灌之馬尿更妙或白糖沖熱酒灌之尤妙然後輕移於懷中抱入室內如前坐法以足緊抵糞門若係婦女連產門一併頂住不令洩氣並將窗櫺遮住房中黑暗最佳再將簡便之藥服之不可大便必使腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可使解所下盡是紫血毒已解下方可令睡使瘀血解盡宜多服上藥更妙。

治跌打青腫丹方 用銀耳四兩焙乾爲細末每服一兩麻油拌勻陳酒冲服藥完其患若失神效非常

(二)用整塊生大黃以生薑汁磨濃敷之一夜紫者轉黑黑者即白矣一日一換甚效

(三)用生半夏末水調敷一夜即消

治跌打吐血丹方 血吐不止者用乾荷花焙研末酒調服一日二三次數日即愈其效如神

治跌打血瘀丹方 用歸尾二錢生地川芎桃仁生大黃紅花各一錢酒水各半煎服自愈

治跌打傷筋丹方 用萆薢搗爛敷一二宵即愈

治打傷眼睛丹方 用老南瓜瓢搗爛厚封眼上將布包好勿動漸即腫消痛定乾則再換如瞳子未

破仍能視也

(二)用生豬肉一片以當歸赤石脂二味爲細末摻肉上貼之拔出瘀血乃痊

治閃頸促腰丹方 用真硼砂研末以燈草蘸點眼四角淚出即鬆連點三次即愈

治閃跌手足丹方 用生大黃和生薑汁磨濃敷之甚效

丹方一千種

一四六

治打傷骨斷丹方 用杉木燒枯研極細末。將白糖蒸融和勻攤在紙上。乘熱貼之。數日可愈。屢試屢驗。

(二)用大紅月季花。採下花瓣。陰乾爲末。一歲一厘。好酒調服。蓋被睡臥一個時辰。渾身骨響。此是接骨。少頃即愈。

治舊傷作痛丹方 用益母草熬膏爲丸。每服數錢。熱酒送下。久服全愈。

治破口傷痛丹方 用珠蘭花。月季花葉。搗爛敷之。立能止血消腫。

(二)用石炭酸一錢。刺納林二兩四錢。混和攤布貼之。

治破口傷風丹方 用手足指甲各一錢。香油炒黃研末。熱酒調服。汗出即愈。

治傷口流血丹方 用瘦豬肉切厚片貼上。立即止血。

(二)用穿山甲炒枯研末。候冷敷上。亦止。

(三)用草紙燒灰。候冷敷之。即止。

治針傷釀膿丹方 用煤炭細末。白沙糖拌融敷之。甚驗。

治戳傷腸出丹方 用好醋、煮溫洗之。隨洗隨入。外用活剝雞皮、乘熱貼上。再服調理藥自愈。雞皮自落。

治手指砍斷丹方 急將手指接上。用蘇木細末敷上。外以絲棉包縛牢固。數日即愈。

治誤斷指頭丹方 用降香、細末摻上。包絲棉不可落水冒風。七日即痊。

治鐵針入肉丹方 用吸鐵石、在外皮離針入處寸許。漸漸移至針口。吸至受傷原處而出。甚效。

治水銀入肉丹方 用真川椒、研末。以雞子清調敷。將布包緊。過夜即出。

治磁片入肉丹方 用白堊、三角形者。不拘多少。浸真菜油內。取出搗爛貼上。日換一次。三次可愈。

治竹木入肉丹方 用松香敷上。以布包裹。三日必出。不痛不癢甚妙。

(二)用生蒲公英、搗爛敷之。雖腫爛亦效。

(三)用豬肉、切片燻熟。貼於患處。以布裹之即出。

治骨刺入肉丹方 用象牙屑和水敷上。立出。

丹方一千種

